

Мелоксидил сироп для кошек, Meloxidyl Cat.

Производитель: Франция, Ceva Sante Animale.

Мелоксидил 0,5 мг/мл применяют котам (кошкам) в качестве:

- противовоспалительного;
- жаропонижающего;
- болеутоляющего при воспалительных и болевых синдромах различной этиологии, включая острые и хронические заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, переломы, синовиты, вывихи и др.), заболевания, сопровождающиеся воспалением мягких тканей;
- анальгезирующего и противовоспалительного средства в послеоперационный период.

Способ применения:

- Препарат применяют животным во время кормления индивидуально перорально в смеси с кормом или непосредственно в рот один раз в сутки.
- Перед применением встряхнуть содержимое флакона до образования однородной суспензии.
- Каждая упаковка снабжена мерным шприцем, цена деления которого соответствует поддерживающей дозе препарата на 1 кг массы животного.
- В первый день лечения требуется двойная поддерживающая доза.
- В первый день лечения препарат применяют в дозе 0,1 мг мелоксикама на 1 кг массы животного (или 0,2 мл препарата «Мелоксидил 0,5 мг/мл» на 1 кг массы тела).
- В последующие дни – в поддерживающей дозе 0,05 мг/ кг (0,1 мл препарата «Мелоксидил 0,5 мг/мл» на 1 кг массы тела) один раз в день с интервалом 24 часа.
- При послеоперационных болях и воспалениях лекарственный препарат применяют в поддерживающей дозе мелоксикама 0,05 мг/кг массы животного до 4 дней после первого инъекционного введения раствора мелоксикама 2 мг/мл согласно инструкции по применению.
- Клинический ответ обычно наступает в течение 7 дней лечения. В случае отсутствия клинического улучшения в течение 14 дней лечение следует прекратить.

Противопоказания:

- Запрещается применение препарата котам (кошкам) при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (язвах и гастритах), сердечно-сосудистой системы, печени и почек, геморрагическом синдроме.
- Не применять лекарственный препарат животным при известной гиперчувствительности к мелоксикаму.
- Не рекомендуется применять препарат беременным и лактирующим кошкам, котятам моложе 6 недель, а также животным в состоянии дегидратации, гиповолемии и гипотензии вследствие возможного токсического влияния мелоксикама на почки.

Побочные реакции:

В рекомендуемых дозах препарат хорошо переносится животными.

В редких случаях возможны: потеря аппетита, апатия, рвота, диарея, скрытая кровь в фекалиях. Побочное действие обычно проявляется в первую неделю лечения и в большинстве случаев самостоятельно проходит после отмены препарата.

Совместимость с другими лекарственными препаратами:

Мелоксидил не рекомендуется применять совместно с другими НПВС, глюкокортикоидами, диуретиками, антикоагулянтами, аминогликозидными антибиотиками и другими лекарственными средствами, для которых характерна высокая степень связывания с сывороточными белками из-за вероятности усиления токсического действия препарата.

Состав: в качестве действующего вещества содержит мелоксикам 0,5 мг/мл, а в качестве вспомогательных веществ ксантановую камедь 0,20 г, безводный коллоидный кремний 2,00 г, сорбитол 30,00 г, глицерин 16,00 г, ксилитол 15,00 г, бензоат натрия 0,20 г, лимонную кислоту до pH 4.0 и воду до 100 мл.

Условия хранения: в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0°C до 25°C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения - 3 года с даты производства. После вскрытия флакона лекарственный препарат можно использовать в течение 6 месяцев.