

ИНСТРУКЦИЯ по применению кормовой добавки Протексин Синбиотик D-C для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта организма собак.
Организация-производитель: «Пробиотикс Интернэшнл Лтд.»/ «Probiotics International Ltd.», (Великобритания)

I. Общие сведения

- 1.Протексин Синбиотик D-C (Protexin Cynbiotic D-C) — кормовая добавка, предназначенная для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта организма собак.
- 2.Кормовая добавка в одной капсуле содержит: микробную массу бактерий Еп1егососсы аесіum (NCIMB 10415) не менее 2×10^9 КОЕ, фруктоолигосахарида — 71,3 мг, гуммиарабика — 71,3, стеарата магния — 0,8 мг.
Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.
- 3.По внешнему виду кормовая добавка представляет собой бежевый сыпучий порошок в белых желатиновых капсулах, размером $13,6 \pm 4$ мм.
- 4.Выпускают Синбиотик D-C расфасованным по 10 капсул в блистеры, индивидуально упакованные в картонные пачки.
Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения добавки, состава и гарантированных показателей, срока и условий хранения, номера партии, количества добавки, даты изготовления, информации о соответствии надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению
Хранят кормовую добавку в упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°C до 25°C .
Добавку следует хранить в местах, недоступных для детей.
Срок хранения кормовой добавки в закрытой упаковке производителя — 24 месяца со дня изготовления.
Запрещается использовать кормовую добавку Протексин Синбиотик D-C по истечении срока годности.

II. Биологические свойства

5. Штамм Еп1егососсп аесіum, входящий в состав кормовой добавки, нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта животных за счет конкурентного исключения условно-патогенных бактерий, стимулирует местную иммунную систему слизистых, нормализует процессы пищеварения.
Гуммиарабик (полисахариды акации) и фруктоолигосахариды являются природными, полностью растворимыми пищевыми волокнами, которые в неизменном виде достигают толстой кишки, где стимулируют рост полезной пробиотической микрофлоры (бифидо- и лактобактерий), а также способствуют активизации процессов пищеварения и улучшают физиологическое состояние организма животных.

III. Порядок применения

6. Протексин Синбиотик D-C применяют для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта организма собак.
- 7.Протексин Синбиотик D-C назначают собакам по 1 капсуле в течение 10 дней перорально, индивидуально в смеси с кормом.
- 8.При применении кормовой добавки Протексин Синбиотик D-C в соответствии с инструкцией побочных явления и осложнений не отмечено. Противопоказаний к применению не установлено.
- 9.Кормовая добавка Протексин Синбиотик D-C совместима с другими кормовыми добавками, лекарственными препаратами (кроме антибиотиков).
- 10.Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки Протексин Синбиотик D-C не устанавливаются.

IV. Меры личной профилактики

- 11.При работе с кормовой добавкой Протексин Синбиотик D-C следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности принятые при работе с кормовыми добавками для животных.

Инструкция разработана ЗЛО «Валта Пет Продактс» (Россия) совместно с «Probiotics International Ltd.», (Великобритания).

Адрес организации — производителя: «Probiotics International», Lopen Head, Southt Petherton, Somerset, TA13 5JH, UK тел. +44 (0) 1460 243 230

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».