

Инструкция по применению вакцины Биофел PCHR для профилактики панлейкопении, калицивирусной, герпесвирусной инфекций и бешенства кошек
(организация - разработчик: АО Биовета, Чешская республика)

I. Общие сведения

Торговое наименование: вакцина Биофел PCHR (Biofel® PCHR).

Международное непатентованное наименование: вакцина для профилактики панлейкопении, калицивирусной, герпесвирусной инфекций и бешенства кошек.

Лекарственная форма: эмульсия для инъекций.

Вакцина изготовлена из инактивированных штаммов вируса панлейкопении (штамм FPV), калицивируса (штамм FCV F), герпесвируса (штамм FITV-1) и вируса бешенства (штамм Vnikovo - 32), с добавлением вспомогательных веществ (тиомерсал, масляный адъювант, эмульгаторы: производные сорбита, глицерида, глицерола) 10%.

По внешнему виду вакцина представляет собой эмульсию розового цвета без осадка.

Вакцина расфасована по 1,0 мл (одна иммунизирующая доза) в стеклянные флаконы соответствующей вместимости. Флаконы герметично укупорены резиновыми пробками, укреплены алюминиевыми колпачками.

Флаконы с вакциной упакованы в пластиковые контейнеры по: 2, 5, 10, 20, 50 и 100 иммунизирующих доз. В каждую коробку с вакциной вложена инструкция по ее применению.

Срок годности вакцины 24 месяца с даты выпуска при соблюдении условия хранения и транспортирования.

По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.

Вакцину Биофел PCHR хранят и транспортируют в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 8°C, отдельно от продуктов питания и кормов.

Вакцину следует хранить в недоступном для детей месте.

Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей, а также остатки вакцины, не использованные в течение 4 часов после вскрытия флаконов, подлежат выбраковке и обеззараживанию путем кипячения в течение 30 минут или обработки 2% раствором щелочи или 5% раствором хлорамина (1:1) в течение 30 минут.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

II. Биологические свойства

Вакцина Биофел PCHR вызывает формирование иммунного ответа у кошек к возбудителям панлейкопении, калицивирусной, герпесвирусной инфекций и

бешенства на 14-21 сутки после ревакцинации, который сохраняется не менее 12 месяцев.

В одной иммунизирующей дозе содержится: не менее $10^{3.0}$ ТЦД₅₀ вируса панлейкопении, не менее $10^{5.5}$ ТЦД₅₀ калицивируса, не менее $10^{5.0}$ ТЦД₅₀ герпесвируса, не менее 1 IU/мл вируса бешенства.

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

III. Порядок применения

Вакцина Биофел РСНР предназначена для профилактики панлейкопении, калицивирусной, герпесвирусной инфекций и бешенства кошек.

Запрещено прививать клинически больных и/или ослабленных животных.

За 10 дней до иммунизации следует провести профилактическую дегельминтизацию.

Запрещается применение препарата беременным и лактирующим *кошкам!*

Вакцинации подлежат кошки, начиная с 3 месячного возраста, с последующей ревакцинацией через 3-4 недели. В дальнейшем животных вакцинируют 1 раз в год.

Вакцину вводят подкожно в дозе 1 мл независимо от породы и массы животного.

Вакцинацию проводят с соблюдением правил асептики и антисептики.

Симптомов проявления панлейкопении, калицивирусной, герпесвирусной инфекций и бешенства или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

Особенностей поствакцинальной реакции при первичной и/или повторной иммунизациях не установлено.

На месте инъекции возможно возникновение припухлости размером с горошину, которая самопроизвольно исчезает в течение 24-48 часов.

Следует избегать нарушения схемы (сроков) введения вакцины, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики панлейкопении, калицивирусной, герпесвирусной инфекций и бешенства. В случае пропуска очередного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается.

Запрещается применять вакцину Биофел РСНР одновременно с другими иммунобиологическими препаратами. Применение других иммунобиологических препаратов возможно с 14 дневным интервалом до или после введения вакцины.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после введения вакцины Биофел РСНР не устанавливаются.

IV. Меры личной профилактики

При работе с вакциной Биофел РСНР следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть в спецодежде и обеспечены индивидуальными средствами защиты. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками, их необходимо промыть большим количеством чистой воды. В случае разлива вакцины контаминированные поверхности подлежат обработке 2% раствором щелочи или 5% раствором хлорамина, инструменты подлежат обеззараживанию путем кипячения в течение 30 минут.

При случайном введении препарата человеку, место инъекции необходимо немедленно обработать 70% этиловым спиртом, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.