

## Диাগель растворимый порошок

Производитель: Inform Nutrition LTD, Ирландия.

### Описание:

Диাগель применяют при нарушении моторики ЖКТ или диарее. Растворимый порошок в пакетиках содержит: моногидрат декстрозы, гидрокарбонат натрия, хлористый калий, гидроксид магния, семена подорожника блошиного.

Диাগель - источник дополнительных витаминов и минералов, усваиваемых углеводов и белков, непереваримой клетчатки. Может быть использован в период диареи или запора.

### Свойства:

- восстанавливает баланс электролитов и глюкозы;
- поддерживает восстановление водного баланса;
- формирует кишечную слизь. Это помогает устранить непроходимость кишечника;
- защищает поврежденный слой слизистой оболочки кишечника;
- связывает патогенные микроорганизмы, токсины и т.д., и удаляет их вместе с фекалиями.

Процентный состав: зола 15,4%, белки 0,9%, клетчатка 30%, жиры 0,3%, натрий 5%, хлор 1,3%, калий 1,9%.

Витамины (добавки на 1 кг): Витамин В1 (тиамин) 250 мг/кг; Витамин В2 (рибофлавин) 750 мг/кг; Витамин В6 (пиридоксин) 250 мг/кг; Никотиновая кислота (ниацин) 300 мг/кг; Пантотеновая кислота 750 мг/кг.

Выпускают в виде порошка, расфасованным в саше по 10 г.

Препарат можно давать с кормом 2-3 раза в день или растворить в теплой воде: 5 г Диাগеля на 125 мл воды. В 1 чайной ложке содержится около 5г порошка.

### Способ применения:

- собаки - ½ пакетика (5 г) на 10 кг массы тела;
- кошки - ¼ пакетика (2,5 г) на одно животное весом около 4 кг.

### Противопоказания:

Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

### Побочные действия:

Побочных явлений и осложнений при соблюдении предписанной дозировки не выявлено.

Условия хранения: препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, хорошо проветриваемом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей и животных месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0°C до 25°C.

Срок годности лекарственного препарата: при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 24 месяца от даты производства. Запрещается применять препарат с истекшим сроком годности.