

Вторая кожа Алюминий

Производитель: Зоопром, Россия.

Описание:

Жидкий пластырь Вторая Кожа Алюминий - улучшенная формула, разработанная специально для животных. Мелкодисперсная алюминиевая пудра в составе обладает охлаждающим эффектом. Имеет специфический запах при нанесении, который выветривается через 1-2 минуты.

Используется как перевязочный материал и вспомогательное средство для защиты операционного поля, образует эластичную пленку со стягивающим рану эффектом. Назначают сельскохозяйственным, мелким домашним животным и птице.

Свойства:

- антимикробное;
- противовоспалительное;
- антигистаминное;
- обезболивающие;
- абсолютно не токсичен.

Показания к применению:

- заживление ран;
- для закрытия пролежней;
- для защиты микротравм от попадания инфекций, раздражающих веществ и воды;
- для местной обработки небольших воспалительных высыпаний на коже, экзем, язв;
- жидкий пластырь Вторая Кожа Алюминий не содержит антибиотиков и поэтому можно применять по мере необходимости.

Действие

- при нанесении на пораженную область образует плотную пленку (которая обладает «дышащим» и подсушивающим эффектами), предотвращающую повторную бактериальную контаминацию и вредное влияние окружающей среды;
- аэрозоль, содержащий измельченную в порошок алюминиевую крошку, защищает кожу животных при повреждениях, кровавых мозолях, экземах, укусах, рваных ранах;
- действует, одновременно охлаждая и разогревая область поражения, за счёт этого происходит обезболивание и приток крови для скорейшей регенерации;
- одно нанесение длительно закрывает место повреждения от воздействия окружающей среды, бактерий, разлизывания животным, а также даёт возможность контролировать вам процесс заживления раны.

Состав: пропеллент 25%, вода очищенная 25%, вспомогательные вещества 10%, сополимер 15%, алюминиевый порошок 25%.

Средство сделано на основе медицинского клея БФ-6 (ДИБУТИЛФТАЛАТ).

Фармакологическое действие дибутилфталата:

- изолирующее;
- ранозаживляющее;
- антисептическое средство.

Фасовка: металлический флакон с распылителем – 150 мл, 350 мл.

Дозировка и способ применения

- перед использованием препарата, обрабатываемое место необходимо очистить от загрязнений, экссудата и крови;
- флакон активно встряхнуть 10–12 секунд, после чего 2–3 секунды равномерно распылить с расстояния 15–20 см;
- спрей нужно нанести в 2-3 слоя, с промежутком в 2-3 минуты;
- после нанесения, животное нужно зафиксировать на 1-3 минуты до полного высыхания спрея.

Противопоказания:

Чувствительность животного к компонентам спрея Жидкий пластырь Вторая Кожа Алюминий.

Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, открытого огня и нагревательных приборов, в недоступном для детей и животных месте. Отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 5 °C до 25 °C.

Флаконы с препаратом следует беречь от ударов.

После использования запрещается сжигать и прокалывать баллон.