

Supramil эмульсия для щенков и собак
Производитель: Астрафарм, Россия.

Supramil эмульсия – первая в мире антигельминтная эмульсия широкого спектра действия для собак массой от 10 до 25 кг, предназначенная для лечения и профилактики заражения круглыми и ленточными гельминтами, а также дирофиляриоза.

Преимущества препарата

- уникальная точность дозирования эмульсии в отличие от таблеток;
- однородная стабильная структура эмульсии не требует предварительного встряхивания, готова к применению в любой момент;
- “Золотой стандарт” лечения гельминтозов: действующими веществами являются R-празиквантел и мильбемицина оксим. Это определяет эффективность препарата против всех видов гельминтов на уровне известных импортных антигельминтиков;
- R-ПРАЗИКВАНТЕЛ: уникальная запатентованная НВП «Астрафарм» субстанция. Благодаря R-празиквантелу повышена безопасность (в результате снижения в 2 раза относительно минимальной дозировки обычного празиквантаря), улучшена поедаемость (благодаря снижению горького вкуса);
- безопасность для собак и щенков, беременных и кормящих животных, что подтверждено исследованиями;
- удобство дачи обеспечено наличием специального безопасного шприц-дозатора;
- достаточно одного применения благодаря составу, точности дозирования и форме выпуска.

Назначение

Для дегельминтизации собак массой тела от 10 до 25 кг.

Состав в 1 мл содержится:

- Supramil эмульсия для щенков и собак массой тела от 10 до 25 кг- R-празиквантел – 12,5 мг, Мильбемицина оксим – 2,5 мг;
- Supramil эмульсия для собак массой тела от 25 до 50 кг- R-празиквантел – 12,5 мг, Мильбемицина оксим – 2,5 мг.

Форма выпуска: эмульсия.

Фасовка

Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 5 мл во флакон из тёмного стекла вместимостью 20 мл или 30 мл.

Флаконы укупоривают адаптером, завинчивают крышкой с контролем первого вскрытия или сразу завинчивают крышкой с контролем первого вскрытия и упаковывают поштучно в картонные пачки в комплекте со

шприцем-дозатором, инструкцией по применению и наклейками в ветеринарный паспорт.

Противопоказания

Противопоказаниями к применению Supramil® эмульсии являются повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата, в том числе в анамнезе, выраженные нарушения функции почек и печени. Дегельминтизацию собак породы колли, бобтейл, шелти (и метисов), ввиду повышенной чувствительности этих пород к макроциклическим лактонам, при необходимости, рекомендуется проводить под наблюдением ветеринарного врача.

Не подлежат дегельминтизации истощённые, больные инфекционными болезнями животные, собаки массой менее 0,5 кг, щенки младше 2-х недель.

Фармакологические свойства

Механизм действия мильбемицина обусловлен повышением проницаемости клеточных мембран для ионов хлора (Cl^-), что приводит к сверхполяризации мембран клеток нервной и мышечной ткани, параличу и гибели чувствительных нематод. Максимальная концентрация мильбемицина оксима в плазме крови собак достигается в течение 2-4 ч; биодоступность составляет около 80%. Из организма соединение выводится в основном в неизмененном виде.

Механизм действия R-празиквантара основан на индуцировании распада тегумента, стойкой деполяризации мышечных клеток гельминта, нарушении энергетического обмена, что вызывает паралич и гибель цестод, и способствует их выведению из желудочно-кишечного тракта.

R-празиквантел быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте, достигая максимальной концентрации в плазме крови через 1-3 часа, обратимо связывается с белками сыворотки крови (70-80 %), частично метаболизируется в печени, реэкскретируется в кишечник, выводится из организма в основном с мочой (до 80 %) в течение 24 часов.

Supramil эмульсия по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007); в рекомендуемых дозах не оказывает сенсибилизирующего, эмбриотоксического и тератогенного действия.

Препарат токсичен для пчел, а также рыб и других гидробионтов.

Применение и дозировка

Supramil эмульсию назначают взрослым собакам с лечебной и профилактической целью при кишечных нематодозах, цестодозах и смешанных инвазиях.

Дегельминтизацию беременных и кормящих самок рекомендуется проводить под наблюдением ветеринарного врача.

Supramil эмульсию применяют животным перорально, однократно, в утреннее кормление с небольшим количеством корма или вводят принудительно на корень языка после кормления в минимальной терапевтической дозе (на 1 кг массы животного): собакам – 2,5 мг/кг R-празиквантара и 0,5 мг/кг мильбемицина оксима, что составляет, для:

- щенков и собак массой от 10 до 25 кг - 1,0 мл эмульсии на 5,0 кг массы тела;
- собак массой от 25 до 50 кг - 1,0 мл эмульсии на 5,0 кг массы тела.

Собакам препарат дают раз в 3 месяца. А также за 10 дней до вакцинации и вязки.

Для профилактики заражения дирофиляриозом собакам препарат даётся перед началом лёта комаров регулярно раз в 28-35 дней. Последний раз препарат дают через месяц после окончания лёта комаров.

Условия хранения, срок годности

Хранить Supramil эмульсию следует в закрытой упаковке производителя, в защищённом от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре не выше 25С, после первого вскрытия флакона - при температуре от 2С до 8С.