

УТВЕРЖДАЮ

И.В. Председатель Комитета
ветеринарного
контроля и надзора МСХ
Республики Казахстан



2024 г.

Инструкция

по применению кормовой добавки

«Тамачи Кальций» (TamachiCalcium)

(Организация-производитель: АО «НПФ «Экопром», Российская Федерация)

Номер регистрационного удостоверения:

Глава 1.«Общие положения»

Торговое наименование кормовой добавки:

«Тамачи Кальций» (Tamachi Calcium)

Форма кормовой добавки:

Таблетки.

Состав кормовой добавки:

Кормовая добавка в 1 г содержит действующие вещества: минеральный премикс Са (кальций) $21,74 \pm 2,17$ мг, Р (фосфор) $10,99 \pm 1,09$ мг, Mg (магний) $16,27 \pm 1,63$ мг, витаминный премикс витамин D₃ (холекальциферол) $44,0 \pm 4,4$ ME, витамин С (аскорбиновая кислота) $6,67 \pm 0,67$ мг; вспомогательные вещества: дрожжи пивные сухие неактивные (*Saccharomyces cerevisiae*) - 37,53 - 45,87%, мука пшеничная - 11,475 - 14,025%, дикальций фосфат дигидрат - 8,793 - 10,747%, стеариновая кислота - 4,77 - 5,83%, лактоза - 4,59 - 5,61%, морской (рыбный) коллаген - 1,8 - 2,2%, сахарная пудра - 1,53 - 1,87%, хлорид натрия - 1,53-1,87%, цитрат кальция - 0,9 - 1,1%, гиалуронат натрия (низкомолекулярный) - 0,9 - 1,1%, сублимированная печень говяжья (порошок сушеный из печени) или мясопродукты сушеные (порошок говядина) - 0,9 - 1,1%, аэросил А - 0,693 - 0,847%, масло кукурузное рафинированное - 0,612 - 0,748%, глицерин - 0,585 - 0,715%, сухое обезжиренное молоко - 0,306 - 0,374%, сыворотка молочная сухая деминерализованная подсырная - 0,306 - 0,374%, фукоидан - 0,09 - 0,11%, сквален - 0,09 - 0,11%.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

Выпускают «Тамачи Кальций» (Tamachi Calcium) расфасованным по 100, 120, 200, 350, 400 таблеток (средняя масса одной таблетки 0,5 г и 1,0 г) в полимерные банки с винтовой горловиной, укупоренные навинчиваемыми крышками.

На единице упаковки размещается этикетка с указанием: торгового наименования кормовой добавки, товарного знака, регистрационного номера, наименования и адреса организации-производителя, назначения и способа применения, состава, гарантируемых показателей, массы таблетки и количества таблеток в упаковке, даты производства, номера партии, срока годности, условий хранения, обозначения СТО, надписи: «Для животных», информации о подтверждении соответствия.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Таблетки овальной или круглой формы от светло-бежевого до темно-бежевого цвета с возможными включениями.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:

Срок годности кормовой добавки при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить кормовую добавку в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75%.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Кормовую добавку транспортируют всеми видами транспорта с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта.

Неиспользованную до конца срока годности кормовую добавку утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

«Биологические свойства»

Биологические свойства кормовой добавки обусловлены входящими в её состав компонентами.

Цитрат кальция является наиболее легкоусвояемой формой кальция, обеспечивает правильное формирование и целостность костного скелета, зубов и соединительных тканей. Регулирует проницаемость клеточных мембран и принимает участие в передаче нервных импульсов, участвует в иммунных процессах, в синтезе и деятельности ряда ферментов. Оптимальное соотношение в добавке кальция, фосфора и магния способствует полноценному усвоению кальция, представляющего собой основной строительный материал для костной и хрящевой тканей. Обеспечивает прочность зубов и костей у собак.

Входящие в состав кормовой добавки витамины Д₃ и С принимают участие в регулировании фосфорно-кальциевого обмена, в росте и минерализации костной ткани, участвуют в образовании и функционировании коллагенов в соединительной ткани. Обмен кальция также связан с обменом витамина С, который способствует нормализации структуры костной ткани.

Морской (рыбный) коллаген является основой соединительной ткани (кости, хрящи, сухожилия, связки) организма, обеспечивающий их прочность и эластичность. Активизирует деятельность клеток, стимулирующих образование костной ткани. Поддерживает оптимальный процесс восстановления суставного хряща и замедляет процессы его дегенерации, улучшает состояние костей и суставов, их подвижность, стабильность и общее состояние.

Гиалуронат натрия входит в состав соединительной ткани и является главным элементом межклеточного матрикса. Стимулирует восстановление

хрящевой ткани, нормализует продукцию внутрисуставной жидкости, улучшает подвижность суставов. Участвует в обмене веществ гиалинового хряща, обеспечивает вязкость синовиальной жидкости и облегчает скольжение суставных поверхностей друг относительно друга при движении.

Фукоидан – сульфатированные полисахариды, входящие в состав бурых водорослей. Образуют биологические соединения, которые способствуют уменьшению воспаления и регенерации тканей, суставов и хрящей, обеспечивают их нормальное функционирование. Стимулируют образование коллагена.

Сквален способствует укреплению костей и суставов, облегчению боли при артритах.

Введение добавки в рацион собак способствует правильному формированию зубов и костной системы организма в период интенсивного роста и развития, улучшению состояния опорно-двигательного аппарата, сокращению реабилитационного периода после операций и заболеваний, ускорению процессов регенерации в поврежденной соединительной ткани.

Глава 2. «Порядок применения кормовой добавки»

Назначение:

Для нормализации фосфорно-кальциевого обмена и укрепления костной ткани у собак.

Показания для применения:

В период интенсивного роста и развития щенков для правильного формирования зубов и костной системы;

При заболеваниях опорно-двигательного аппарата для улучшения его состояния;

В период восстановления после операций для ускорения процессов регенерации в поврежденной костной ткани.

Способы применения и режим дозирования:

Кормовую добавку применяют ежедневно, вводят в корм или задают перед кормлением перорально с руки. Собакам - из расчета 1 таблетка массой 1,0 г на 10 кг массы тела или 1 таблетка массой 0,5 г на 5 кг массы тела.

Курс применения составляет 3 месяца. Возможно повторное применение при необходимости.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с настоящей инструкцией не установлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Кормовая добавка не предназначена для кормления продуктивных животных.

Организация-производитель: АО «НПФ «Экопром», Российская Федерация, 140070, Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263.

Организация-разработчик: АО «НПФ «Экопром», Российская Федерация, 140070, Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263.