

**Инструкция по применению гомеопатического препарата Веракол
для лечения воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта
у сельскохозяйственных и мелких домашних животных**
(Организация - разработчик ООО «АлексАнн», Московская область)

I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: Веракол (Verakol).

Международное непатентованное наименование: Veratrum album, Acidum arsenicosum, Colocynthis, Podophyllum peltatum.

Лекарственная форма: раствор для инъекций.

В качестве действующих веществ Веракол содержит матричные настойки растительного происхождения и минеральные компоненты (в 1000 мл):

- Veratrum album Ø=D1 5 мл;
- Acidum arsenicosum Ø=D2 0,5 мл;
- Podophyllum peltatum Ø 1,5 мл;
- Colocynthis Ø=D1 5 мл;

а также вспомогательные компоненты: натрия хлорид - 9,0 г; вода для инъекций до 1000 мл.

Выпускают Веракол расфасованным по 10, 20, 50, 70, 75, 100, 200 и 500 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, герметично укупоренные резиновыми пробками и обкатанные алюминиевыми колпачками.

Веракол хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°C до 25°C.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года с даты производства.

Препарат запрещается применять по истечении срока годности.

Хранят в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

Веракол относится к комплексным гомеопатическим лекарственным препаратам.

Обладает противовоспалительным и спазмолитическим действием при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

По степени воздействия на организм лекарственный препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает местно-раздражающим и сенсибилизирующим действием.

III. Порядок применения

Веракол назначают мелким домашним и сельскохозяйственным животным для лечения воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе гастрита, гастроэнтерита, диспепсии, пищевой токсикоинфекции.

Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам.

Веракол вводят внутримышечно или подкожно 2-3 раза в сутки в течение 5-10 дней.

Разовая доза Веракола на одно животное составляет:

- лошадям - 8-10 мл;

- крупному рогатому скоту, свиньям - 5 мл;
- свиньям - 3 мл;
- телятам, поросятам - 2,5 мл;
- овцам, козам - 3 мл;
- собакам 1 мл/10 кг массы животного;
- кошкам 0,5-1 мл.

Симптомы передозировки у животных не установлены.

Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы необходимо ввести ее как можно скорее, Далее интервал до следующего введения препарата не изменяется.

При применении Веракола в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного в случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства, (3-адреномиметики, кортикоステроиды или другое симптоматическое лечение.

Применение Веракола не исключает использования других лекарственных препаратов этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

Продукты животного происхождения во время и после применения Веракола могут использоваться без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

При работе с Вераколом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. После работы с лекарственным препаратом следует вымыть руки с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Веракола следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).