

КАНТАРЕН

(Организация-производитель ООО «АлексАнн», Московская обл.)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кантарен — комплексное гомеопатическое лекарственное средство, содержащее в 1000 мл, в качестве действующих веществ: *Berberis vulgaris* Ø=D1 – 30 мкл, *Cuprum arsenicosum* D6 – 0,02 мкл, *Hepar sulfuris* D4 trituration – 0,20 г, *Lytta vesicatoria* Ø=D1 – 0,3 мкл и вспомогательные вещества: метил парагидроксибензоат – 0,5 г, натрия хлорид – 5,8 г, натрия ацетата тригидрат – 2,0 г, кислота соляная до pH 5,4, спирт этиловый 95% – 5,26 г, вода для инъекций.

Выпускают Кантарен в форме стерильного раствора для инъекций, расфасованного по 10 и 100 мл в стеклянных флаконах соответствующей вместимости, герметично укупоренных и обкатанных алюминиевыми колпачками, а также в форме раствора для перорального применения — в полимерных флаконах с пробкой-капельницей по 20 мл.

Хранят Кантарен в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 0 °С до 25 °С.

Срок годности Кантарена при соблюдении условий хранения — 3 года со дня изготовления. Запрещается использовать Кантарен после окончания срока его годности.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Кантарен обладает салуретическим, противовоспалительным, спазмолитическим и диуретическим действием.

По степени воздействия на организм препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает местнораздражающим и сенсibiliзирующим действием.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Кантарен применяют для лечения цистита, урологического синдрома и мочекаменной болезни.

Кантарен раствор для инъекций вводят подкожно или внутримышечно. В острых случаях — 1-3 раза в день до стабилизации состояния. Продолжительность лечения 7-10 дней. При подостром и хроническом течении болезни — 1 раз в день в течение 3-4 недель. При необходимости курс повторяют. Разовая доза препарата на одно животное составляет:

лошадям 10,0 – 15,0 мл

жеребят 2,0 – 2,5 мл

собакам крупных и средних пород 2,0 – 4,0 мл

собакам мелких пород, кошкам, щенкам, котят 0,5 – 2,0 мл

хорьки, фретки 0,5 мл

грызунам 0,2 – 0,3 мл

Кантарен в каплях задают животным индивидуально перорально.

- для профилактики рецидивов мочекаменной болезни – 2 раза в день в течение 3 недель;

- в комплексной терапии острого цистита – 2 раза в день в течение 2 недель;
- в комплексной терапии мочекаменной болезни – 3 раза в день в течение 3 недель.

Разовая доза препарата на одно животное составляет: кошкам, собакам, пушным зверям – 1 капля/1 кг массы животного.

Кантарен не вызывает побочного действия и осложнений при применении в соответствии с настоящей инструкцией.

Применение Кантарена не исключает использования других лекарственных средств.

Продукция животноводства во время и после применения Кантарена используется без ограничений. Компоненты, входящие в состав препарата в сверхмалых дозах, в организме животного не накапливаются.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

При работе с Кантареном следует соблюдать общие правила безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Запрещается использовать флаконы из-под Кантарена для пищевых целей.