

**Инструкция по применению гомеопатического препарата Ковертал
животным при заболеваниях печени различной этиологии**
(Организация - разработчик: ООО «АлексАнн», Московская область)

I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: Ковертал.

Международное непатентованное наименование: не присвоено.

Лекарственная форма: раствор для инъекций

В качестве действующих веществ Ковертал содержит компоненты растительного происхождения (в 1000 мл): Chelidonium majus D12 200 мл; Lycopodium D16 150 мл; Veronica D4 150 мл; Carduus marianus D4 150 мл; Colocynthis D8 150 мл; Taraxacum D4 200 мл и вспомогательные вещества: метил парагидроксибензоат - 0,5 г, натрия хлорид - 5,8 г, натрия ацетата тригидрат - 2,0 г, кислоту соляную до pH 5,4, спирт этиловый 95% - 5,26 г, воду для инъекций до 1000 мл.

По внешнему виду препарат представляет собой бесцветную прозрачную жидкость.

Выпускают Ковертал расфасованным по 10 и 100 мл в стеклянные флаконы, укупоренные резиновыми пробками и алюминиевыми закатываемыми колпачками. Флаконы по 10 мл поштучно упаковывают в индивидуальные картонные пачки. Каждая единица фасовки сопровождается инструкцией по применению.

Ковертал хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 до 30°C.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года с даты производства, после первого вскрытия флакона - 21 день.

Ковертал запрещается применять по истечении срока годности.

Ковертал следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

Ковертал относится к комбинированным гомеопатическим лекарственным препаратам. Входящие в состав лекарственного средства активные компоненты в гомеопатических разведениях способствуют активации и защите фосфолипидозависимых ферментных систем гепатоцитов, улучшают детоксикационную функцию печени обладают гепатопротекторным и противовоспалительным действием, оказывают выраженное спазмолитическое, антихолестатическое действие.

По степени воздействия на организм лекарственный препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), не обладает местнораздражающим и сенсибилизирующим действием.

III. Порядок применения

Ковертал назначают с лечебной целью собакам, кошкам, крупному рогатому скоту, лошадям при острых и хронических гепатитах, гепатозах, жировой дегенерации печени, токсических поражениях печени, инфекционных и инвазионных заболеваниях в качестве сопутствующей терапии.

Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам.

Ковертал применяют внутримышечно или подкожно в разовых дозах:

- собакам, кошкам - 0,1 мл/1 кг массы животного;
- крупному рогатому скоту, лошадям - 5,0 мл/животное;

- телятам, жеребятам - 2,0-3,0 мл/животное.

В острых случаях заболевания Ковертал применяют 1 раз в сутки в течение 10-14 дней, при хронических заболеваниях 2-3 раза в неделю в течение 3-5 недель.

Симптомы передозировки у животных не установлены.

Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической и профилактической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата следует возобновить как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

При применении Ковертала в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и возникновении аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

Применение Ковертала не исключает использования других лекарственных препаратов этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

Продукция животного происхождения во время и после применения Ковертала может быть использована без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

При работе с Коверталом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. После работы с препаратом следует вымыть руки с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Ковертала следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае возникновения аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.