

**Инструкция по применению гомеопатического препарата Мастометрин для профилактики и лечения воспалительных заболеваний репродуктивных органов и молочной железы самок животных**

(Организация - разработчик: ООО «АдексАнн», Московская область)

**I. Общие сведения**

Торговое наименование лекарственного препарата: Мастометрин (Mastometriti®).

Международное непатентованное наименование: не присвоено.

Лекарственная форма: раствор для инъекций.

В качестве действующих веществ Мастометрин содержит матричные настойки растительного и органического происхождения (в 1000 мл): Pulsatilla pratensis D11 1мкл; Juniperus sabina Ø 0,03 мл; Sepia D4 0,1 г; Lachesis D4 0,001 мл; АСД-2 0,01 нл и вспомогательные вещества: метил парагидроксибензоат - 0,5 г, натрия хлорид - 5,8 г, натрия ацетата тригидрат - 2,0 г, кислоту соляную до рН 5,4, спирт этиловый 95% - 5,26 г, воду для инъекций до 1000 мл.

По внешнему виду препарат представляет собой бесцветную прозрачную жидкость.

Выпускают Мастометрин расфасованным по 10 и 100 мл в стеклянные флаконы, укупоренные резиновыми пробками и обкатанные алюминиевыми колпачками.

Флаконы по 10 мл упаковывают в индивидуальные картонные пачки.

Каждую единицу упаковки снабжают инструкцией по применению.

Мастометрин хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 до 30°C.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года с даты производства, после первого вскрытия флакона - 21 день.

Запрещается применять по истечении срока годности.

Мастометрин следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

**II. Фармакологические свойства**

Мастометрин относится к комбинированным гомеопатическим лекарственным препаратам.

Обладает противовоспалительным действием, повышает тонус и сократительную способность миометрия, восстанавливает структуру и функцию эндометрия, стимулирует тканевой иммунитет и повышает бактерицидные свойства цервикальной слизи.

По степени воздействия на организм лекарственный препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), не обладает местнораздражающим и сенсибилизирующим действием.

**III. Порядок применения**

Мастометрин назначают самкам крупного рогатого скота, свиней, лошадей пушных зверей, кошкам, собакам для лечения воспалительных заболеваний репродуктивных органов и молочной железы: острого, хронического и субклинического эндометрита, синдрома MMA, острого серозного и катарального мастита а также профилактики послеродовых осложнений.

Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам.

Мастометрин уводят внутримышечно или подкожно:

- **Сельскохозяйственным животным:**
  - для лечения хронического и субклинического эндометрита, синдрома ММА 3-4 инъекции с интервалом три дня;
  - для лечения острого серозного и катарального мастита 1 раз в сутки в течение 3-5 дней.
- **Собакам, кошкам и пушным зверям:**
  - для профилактики послеродовых осложнений - после родов 1-2 инъекции с интервалом 24-48 часов;
  - при остром течении мастита и эндометрита 1 -2 раза в сутки в течение 5-7 дней;
  - при подостром и хроническом течении эндометрита 2-3 раза в неделю.

Длительность курса лечения устанавливается ветеринарным врачом, но не более 1 месяца.  
Разовая доза препарата на одно животное составляет:

- крупному рогатому скоту, свиньям - 5,0 мл/животное;
- лошадям - 8,0-10,0 мл/животное;
- собакам - 0,1 мл/1 кг массы животного;
- кошкам, пушным зверям - 0,5-1,0 мл/животное.

Симптомы передозировки у животных не установлены.

Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической и профилактической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата следует возобновить как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

При применении Мастометрина в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений к осложнений, как правило, не отмечается. При повышенной индивидуальной чувствительности и возникновении аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

Применение Мастометрина не исключает использования других лекарственных препаратов этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

Продукция животного происхождения во время и после применения Мастометрина может быть использована без ограничений.

#### **IV. Меры личной профилактики**

При работе с Мастометрином следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. После работы с лекарственным препаратом следует вымыть руки с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Мастометрина следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае возникновения аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

Дополнительная информация:

**Схемы применения Мастометрина в лечении болезней животных**

Собаки, кошки, другие мелкие домашние животные:

<b>Показания</b>	<b>Инъекции п/к или в/м</b>
Острый эндометрит (совместно с Овариовитом)	1-2 раза в день в течение 10-14 дней
Вагинит	1-2 раза в день в течение 5 дней
Мастит (совместно с Травма-гелем)	1-2 раза в день, курс 5-7 дней
Профилактика послеродовых осложнений (мастит, эндометрит, субинволюция матки, гипогалактия, задержание последа)	1-2 инъекции в течение 12-48 часов после родов
Задержание последа	1-2 инъекции в течение 24-48 часов после родов