

Инструкция по применению гомеопатического препарата Овариовит для профилактики и лечения нарушений функции яичников у самок сельскохозяйственных животных, пушных зверей, кошек и собак
(Организация - разработчик: ООО «АлексАнн», Московская область)

I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: Овариовит (Ovariovit).

Международное непатентованное наименование: не присвоено.

Лекарственная форма: раствор для инъекций.

В качестве действующих веществ Овариовит содержит матричные настойки растительного происхождения, органические и минеральные компоненты (в 1000 мл): Turneradiffusa Ø=D1 0,01 мл; Aquilegiavulgaris Ø 4,5 мкл; Pulsatillapratensis Ø 0,6 нл; Aristolochiaclematitis Ø 3 мкл; Aurumjodatum D4 trituration 0,1 г; Sepia D4 trituration 0,02 мкг; Calciumcarbonicum D4 trituration 0,1 г и вспомогательные вещества: метил парагидроксibenзоат - 0,5 г, натрия хлорид - 5,8 г, натрия ацетата тригидрат - 2,0 г, кислоту соляную до pH 5,4, спирт этиловый 95% - 5,26 г, воду для инъекций до 1000 мл. По внешнему виду препарат представляет собой бесцветную прозрачную жидкость.

Выпускают Овариовит расфасованным по 10 и 100 мл в стеклянные флаконы, укупоренные резиновыми пробками и алюминиевыми закатываемыми колпачками. Флаконы по 10 мл поштучно упаковывают в индивидуальные картонные пачки. Каждая единица фасовки сопровождается инструкцией по применению.

Овариовит хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 до 30°C.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года с даты производства, после первого вскрытия флакона - 21 день. Запрещается применять по истечении срока годности.

Овариовит следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

Овариовит относится к комбинированным гомеопатическим лекарственным препаратам. Восстанавливает функцию яичников. Регулирует половую цикличность, стимулирует выработку гонадотропных гормонов и овогенез, повышает оплодотворяемость.

По степени воздействия на организм лекарственный препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), не обладает местнораздражающим и сенсibilизирующим действием.

III. Порядок применения

Овариовит назначают самкам сельскохозяйственных животных, пушных зверей, кошкам и собакам для лечения и профилактики нарушений функции яичников (гипофункция, персистентное желтое тело, фолликулярные кисты), ложной беременности, для повышения оплодотворяемости.

Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам.

Овариовит применяют внутримышечно или подкожно 2-3 раза в неделю, двух-четырехкратно.

Сельскохозяйственным животным для повышения оплодотворяемости и снижения

эмбриональной смертности препарат вводят при признаках половой охоты однократно за 8-10 часов до предполагаемого осеменения.

Разовая доза препарата на одно животное составляет:

- крупному рогатому скоту, свиньям - 5,0 мл/животное;
- лошадям - 8,0-10,0 мл/животное;
- козам, овцам - 3,0 мл/животное;
- пушным зверям, кошкам - 0,5-1,0 мл/животное;
- собакам - 0,1 мл/1 кг массы животного.

Симптомы передозировки у животных не установлены.

Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической и профилактической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата следует возобновить как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

При применении Овариовита в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и возникновении аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

Применение Овариовита не исключает использования других лекарственных препаратов этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

Продукция животного происхождения во время и после применения Овариовита может быть использована без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

При работе с Овариовитом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. После работы с лекарственным препаратом следует вымыть руки с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Овариовита следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае возникновения аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

Организация-производитель: ООО «АлексАнн», 141700, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13.

Адрес места производства: 141700, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Овариовита, утвержденная Россельхознадзором 09 ноября 2012 года.

Дополнительная информация:

Схемы применения Овариовита для лечения и профилактики болезней репродуктивной системы самок:

Собаки, кошки, другие мелкие домашние животные:

Показания	Инъекции п/к или в/м
Ложная беременность	1 раз в день в течение 4-6 дней, далее через день 3-4 инъекции (при необходимости продолжить еще 2-3 недели)
<u>Анэстрия</u> (отсутствие течки), гипофункция яичников, нарушения половых циклов	1-2 раза в неделю в течение 4-5 недель с повторением курса через полгода
Последствия применения гормональных контрацептивов: гиперфункция яичников, фолликулярные кисты	2-3 раза в неделю, курс 4-6 недель
Хронический эндометрит (совместно с <u>Мастометрином</u>)	2-3 раза в неделю в течение 3 недель
Подготовка в вязке (повышение <u>оплодотворяемости</u>)	1 раз в 2-3 дня, начиная с 1-го дня течки (2-4 инъекции)
Профилактика ложной беременности	1 раз в 3-4 дня, через 1-1,5 месяца после окончания течки. Курс 4-6 недель
Профилактика <u>посткастрационных</u> осложнений у самок	1 раз в 3 дня в течение 1 месяца после операции (<u>овариоэктомии</u>)
Профилактика эмбриональной смертности	На 5 и 10 день после оплодотворения