

**Инструкция по применению гомеопатического препарата Фоспасим животным
для профилактики и лечения стресса, гипервозбудимости и коррекции нарушений
поведения**

(Организация - разработчик: ООО «АлексАнн», Московская область)

I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: Фоспасим (Fospasim®).

Международное непатентованное наименование: не присвоено.

Лекарственная форма: раствор для инъекций и раствор для перорального применения (капли).

В качестве действующих веществ **Фоспасим для инъекций** содержит матричные настойки растительного, органического происхождения и минеральные компоненты (в 1000 мл): Phosphorus D12 50 мл; Aconitum D12 50 мл; Hyoscyamus D9 50 мл; Passiflora D9 50 мл; Moshus D4 50 мл; Ignatia D6 50 мл; Platinum D7 50 мл и вспомогательные вещества: метил парагидроксибензоат - 0,5 г, натрия хлорид - 5,8 г, натрия ацетата три гидрат - 2,0 г, кислоту соляную до pH 5,4, спирт этиловый 95% - 5,26 г, воду для инъекций до 1000 мл.

Фоспасим капли для перорального применения содержат матричные настойки растительного, органического происхождения и минеральные компоненты (в 1000 мл): Phosphorus Ø=D3 0,5 нл; Aconitum napellus Ø 1 пкл; Hyoscyamus niger Ø 1 нл; Passiflora incarnata Ø 1,5 нл; Moshus moschiferus Ø=D1 0,5 мл; Strychnos ignatii Ø 5 мкл; Platinum metallicum Ø=D4 5 мг и вспомогательные вещества: глицерин до 35% масс, и воду очищенную до 1000 мл.

По внешнему виду препараты представляют собой бесцветную прозрачную жидкость.

Выпускают Фоспасим для инъекций расфасованным по 10 и 100 мл в стеклянные флаконы, укупоренные резиновыми пробками и обкатанные алюминиевыми колпачками. Флаконы по 10 мл поштучно упаковывают в индивидуальные картонные пачки. Каждая единица фасовки сопровождается инструкцией по применению.

Фоспасим капли выпускают расфасованными по 20 мл в полимерные флаконы с винтовой горловиной соответствующей вместимости, комплектуемые навинчивающей крышкой с контролем первого вскрытия и пробкой-капельницей. Флаконы упаковывают поштучно в индивидуальные картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

Фоспасим хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 до 30°C.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года с даты производства, после первого вскрытия флакона - 21 день. Фоспасим запрещается применять по истечении срока годности.

Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

Фоспасим относится к комбинированным гомеопатическим лекарственным препаратам. Оказывает выраженное анксиолитическое действие, препятствует развитию гиперкинезов, локомоторной стереотипии, повышенной эмоциональной реактивности, нормализует эмоционально-психическое состояние, улучшает ориентировочные реакции и обучение.

По степени воздействия на организм лекарственный препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), не обладает местнораздражающим и сенсибилизирующим действием.

III. Порядок применения

Фоспасим назначают собакам, кошкам, кроликам, декоративным грызунам лошадям, крупному рогатому скоту при неврозах, повышенной возбудимости, поведенческих расстройствах, фобиях (боязнь шумов и взрывов - салютов, фейерверков, грозы, выстрелов и т.д.), стрессе (расставании с хозяином, раннем отлучении молодняка от матери, перегруппировке, транспортировке), для адаптации, оптимизации процесса дрессировки, при синдроме хронической усталости у служебных собак, в качестве компонента премедикации.

Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам.

Фоспасим инъекции применяют внутримышечно или подкожно в разовых дозах:

- собакам, кошкам, кроликам - 0,1 мл/1 кг массы животного;
- декоративным грызунам - 0,2 мл/животное;
- лошадям - 1,0 мл/100 кг массы животного;
- крупному рогатому скоту - 5,0 мл/животное;
- телятам - 3,0-3,5 мл/животное.

Для коррекции неврозов, поведенческих расстройств, повышенной возбудимости, стрессовых состояний Фоспасим вводят 1 раз в сутки в течение 5-14 дней.

Для профилактики стресса у животных при проведении различных мероприятий и манипуляций Фоспасим назначают за 1 час до предполагаемых манипуляций. Как компонент премедикации Фоспасим вводят за 15-20 минут до введения препаратов, обеспечивающих общую анестезию.

Фоспасим капли применяют животным перорально индивидуально принудительно в следующих разовых дозах (на животное):

- собакам - 2 капли/1 кг массы животного;
- кошкам - 3 капли/1 кг массы животного;
- декоративным грызунам - 2-3 капли/животное.

Капли применяются перорально 1-2 раза в день в течение 7-14 дней.

Схемы применения инъекций и капель Фоспасим различным видам животных

Собаки, кошки:

Показания	Инъекции п/к или в/м	Раствор для перорального применения (капли)
Фобические неврозы (боязнь шумов, фейерверков, грозы, выстрелов и пр.)	1 раз в день. От 1 до 14 дней.	1 раз в день. От 1 до 14 дней.
Страх одиночества	1 раз в день, курс 7-14 дней.	1-2 раза в день в течение 7-14 дней.
Транспортировка	1 инъекция за 30-60 минут до поездки.	Однократно за 30-60 минут до поездки.
Адаптация к новым условиям (в том числе - участие в выставках)	Ежедневно, за 1-2 дня до начала стрессовой ситуации. Курс 7-14 дней.	Ежедневно, за 1-2 дня до начала стрессовой ситуации. Курс 7-14 дней.
Как компонент премедикации перед введением в наркоз	1 инъекция п/к, в/в за 15-20 минут до введения основных препаратов	

Симптомы передозировки у животных не установлены.

Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической и профилактической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата следует возобновить как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

При применении Фоспасима в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. При повышенной индивидуальной чувствительности и возникновении аллергических реакций использование препарата

прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

Применение Фосспасима не исключает использования других лекарственных препаратов этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

Продукция животного происхождения во время и после применения Фосспасима может быть использована без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

При работе с Фосспасимом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. После работы с лекарственным препаратом следует вымыть руки с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Фосспасима следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае возникновения аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).