

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Эмицидин[®] капсул для лечения
патологических состояний, сопровождающихся гипоксией у собак и кошек

(Организация-разработчик: ООО "НВЦ Агроветзащита", 129329, Россия, г. Москва,
Кольская ул., д. 1, стр. 1)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Эмицидин[®] капсулы (Emicidini[®] capsulis).

Международное непатентованное наименование лекарственного препарата: этилметилгидроксипиридина сукцинат.

2. Лекарственная форма: капсулы для орального применения.

Лекарственный препарат выпускают в капсулах по 15 мг и 50 мг. В качестве действующего вещества препарат в одной капсуле содержит соответственно 15 мг и 50 мг этилметилгидроксипиридина сукцината, а в качестве вспомогательного вещества тальк.

3. По внешнему виду препарат представляет собой твёрдые желатиновые капсулы.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 3 года со дня производства. Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Эмицидин[®] капсулы выпускают расфасованным по 10, 20 капсул в блистеры из поливинилхлоридной пленки и по 1, 2, 3 блистера упаковывают в картонную пачку, а так же по 30, 50, 120 и 200 капсул в полимерные или стеклянные банки с крышками, упаковывают в картонные пачки вместе с инструкцией по применению. Банки по 120 и 200 капсул выпускают без помещения в картонную пачку. Каждая потребительская упаковка снабжается инструкцией по применению препарата.

5. Хранят Эмицидин[®] капсулы в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0⁰С до 25⁰С.

6. Эмицидин[®] капсулы следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Эмицидин® капсулы относятся к группе антиоксидантных лекарственных препаратов.

10. Входящее в состав препарата действующее вещество этилметилгидроксипиридина сукцинат является ингибитором свободно-радикальных процессов в организме, обладает выраженными антиоксидантными, антигипоксическими и мембранопротекторными свойствами, оказывает лечебное и профилактическое действие при гипоксиях различной этиологии.

Механизм действия заключается в способности препарата уменьшать процессы перекисного окисления липидов в мембранах клеток, связывать свободные радикалы, влиять на энергетический обмен, увеличивая степень энергизации клеток, повышать устойчивость организма к кислородной недостаточности.

После перорального применения этилметилгидроксипиридина сукцинат легко всасывается в желудке и в двенадцатиперстной кишке, из организма выводится в течение 4-6 часов с мочой, главным образом в виде метаболитов и в незначительном количестве в неизменном виде.

Эмицидин® капсулы по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает местно-раздражающими, кумулятивными, эмбриотоксическими и тератогенными свойствами.

III. Порядок применения

11. Эмицидин® капсулы назначают собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью при острой, хронической сердечно-сосудистой и сердечно-легочной недостаточности, в восстановительный период после перенесенных заболеваний и хирургических операций, в ветеринарной гериатрии, при патологических состояниях, сопровождающихся гипоксией (кислородной недостаточностью) органов и тканей, при раневой патологии (раны, дерматиты, трофические язвы, ожоги, обморожения).

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата.

13. Эмицидин® капсулы применяют самостоятельно, а также в сочетании с лекарственными средствами специфической и симптоматической терапии индивидуально перорально, независимо от времени кормления животного.

С лечебной целью Эмицидин® капсулы применяют два раза в сутки в течение 10-30 дней в следующих разовых дозах, указанных в таблице:

Вид животного	Масса животного, кг	Эмицидин® капсулы	
		капсулы по 15 мг, шт	капсулы по 50 мг, шт
Собаки мелких пород, кошки	5-10	1	
Собаки средних пород	10-30	2	
Собаки крупных пород	30-50		1
	более 50		2-3

С профилактической целью Эмицидин® капсулы применяют в терапевтических дозах один раз в сутки в течение 15-30 дней. При необходимости через 1-2 месяца курс применения препарата повторяют.

В ветеринарной гериатрии Эмицидин® капсулы применяют собакам и кошкам старше 7 лет в весенний и осенний период один раз в сутки в терапевтической дозе в течение 30 суток.

14. Симптомы передозировки у животных не установлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

16. Лекарственный препарат разрешен для применения животным в период беременности и лактации.

17. Следует избегать нарушений рекомендуемой схемы применения лекарственного препарата во избежание снижения его эффективности. В случае пропуска введения одной или нескольких доз препарата курс применения необходимо возобновить как можно скорее в той же дозе по той же схеме.

18. При использовании Эмицидин® капсул в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

19. Эмицидин® капсулы совместимы с другими лекарственными препаратами, кормами и кормовыми добавками.

20. Эмицидин® капсулы не предназначены для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Эмицидин® капсулами следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Эмицидин® капсулами. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305,
Московская область, г. Сергиев-Посад, ул.
Центральная, д.1

Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305,
Московская область, г. Сергиев-Посад, ул.
Центральная, д.1

Номер регистрационного удостоверения 77-3-30.12-2972 N17BP-3-45/01634

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Эмицидин® капсул, утвержденная Россельхознадзором 15 июля 2014 года.