

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Эмицидин 2,5% раствор для инъекций для лечения патологических состояний, сопровождающихся гипоксией у собак и кошек

(Организация-разработчик: ООО "НВЦ Агроветзащита", г. Москва)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Эмицидин 2,5% раствор для инъекций (Solutio emicidini 2,5% pro injectionibus).

Международное непатентованное наименование: этилметилгидроксипиридина сукцинат.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Эмицидин 2,5% раствор для инъекций в качестве действующего вещества в 1,0 мл содержит этилметилгидроксипиридина сукцината – 25 мг, а в качестве вспомогательного вещества – воду для инъекций до 1,0 мл.

По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный раствор, бесцветного или светло-желтого цвета.

3. Эмицидин 2,5% раствор для инъекций выпускают расфасованным по 1, 2, 3 и 5 мл в ампулах, упакованных по 5 или 10 штук в контурную ячейковую упаковку, которую помещают в пачку из картона. По 2, 5, 10, 50 и 100 мл в стеклянные флаконы; флаконы по 2, 5 и 10 мл поштучно или по 4, 5, 6, 8, 10 штук вместе с инструкцией по применению помещают в пачки из картона; флаконы по 50 и 100 мл вместе с инструкцией по применению помещают индивидуально в картонную пачку; допускается выпуск препарата расфасованным по 50, 100 мл в стеклянные флаконы без помещения в картонную пачку.

4. Хранят Эмицидин 2,5% раствор для инъекций в закрытой упаковке производителя в защищенном от света и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 5 °С до 25 °С.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

5. Эмицидин 2,5% раствор для инъекций следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями действующего законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Эмицидин 2,5% раствор для инъекций относится к группе антиоксидантных лекарственных препаратов. Входящее в состав препарата действующее вещество – этилметилгидроксипиридина сукцинат является ингибитором свободно-радикальных процессов в организме, обладает выраженными антиоксидантными, антигипоксическими и мембранопротекторными свойствами, оказывает лечебное и профилактическое действие при гипоксиях различной этиологии.

Механизм действия заключается в способности препарата уменьшать процессы перекис-

ного окисления липидов в мембранах клеток, связывать свободные радикалы, влиять на энергетический обмен, увеличивая степень энергизации клеток, повышать устойчивость организма к кислородной недостаточности.

После парентерального применения препарат быстро распределяется в органах и тканях животного. Выводится из организма в основном с мочой в виде метаболитов и в незначительном количестве в неизменном виде.

Эмицидин 2,5% раствор для инъекций по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает местно-раздражающими, кумулятивными, эмбриотоксическими и тератогенными свойствами.

III. Порядок применения

8. Эмицидин 2,5% раствор для инъекций применяют собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью при острой, хронической сердечно-сосудистой и сердечно-легочной недостаточности, в восстановительный период после перенесенных заболеваний или хирургических операций, в ветеринарной гериатрии, при патологических состояниях, сопровождающихся гипоксией (кислородной недостаточностью) органов и тканей, при раневой патологии (раны, дерматиты, трофические язвы, ожоги, обморожения).

9. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата.

10. С лечебной и профилактической целью Эмицидин 2,5% раствор для инъекций вводят подкожно, внутримышечно или внутривенно (капельно, со скоростью 60 капель в минуту) в дозе 1,0 - 4,0 мл препарата на 10 кг массы животного (2,5 - 10 мг/кг массы животного по действующему веществу). Кратность введения препарата - один или два раза в сутки в течение 5-15 дней.

В ветеринарной гериатрии Эмицидин 2,5% раствор для инъекций применяют собакам и кошкам старше 7 лет в весенний и осенний период один раз в сутки в течение 10-30 дней в дозе 1,0 мл на 10 кг массы тела (2,5 мг/кг действующего вещества).

Дозу, продолжительность курса и кратность применения препарата назначает лечащий ветеринарный врач в зависимости от физиологического состояния животного и течения болезни.

11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене выявлено.

13. Следует избегать нарушений рекомендуемой схемы применения лекарственного препарата во избежание снижения его эффективности. В случае пропуска введения одной или нескольких доз препарата курс применения необходимо возобновить как можно скорее в той же дозе по той же схеме.

14. При применении Эмицидина 2,5% раствора для инъекций в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

15. Применение Эмицидина 2,5% раствора для инъекций не исключает использование других средств патогенетической и симптоматической терапии.

16. Эмицидин 2,5% раствор для инъекций не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Эмицидином 2,5% раствором для инъекций следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочка-

ми глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Эмицидином 2,5% раствором для инъекций. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ООО "НВЦ Агроветзащита С-П.", 141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, 1.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Эмицидин 2,5% раствора для инъекций, утвержденная Россельхознадзором 29 ноября 2012 года.

Инструкция разработана: ООО "Научно-внедренческий центр Агроветзащита", 129329, Россия, г. Москва, Кольская ул., 1, стр. 1.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения