

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Ауризонa для лечения отита бактериальной и
грибковой этиологии у собак

(организация-производитель фирма «Vetoquinol S.A.»/
«Ветокинол S.A.», Франция))

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Ауризон (Aurizon).
Международное непатентованное наименование: марбофлоксацин + клотри-
мазол + дексаметазон.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения (капли ушные).

Ауризон в качестве действующих веществ в 1 мл содержит: марбофлоксацин -
3 мг, клотримазол – 10 мг, дексаметазона ацетат - 0,9 мг, а в качестве
вспомогательного компонента пропиол галлат – до 1 мл.

Выпускают Ауризон расфасованным по 10 см³ в пластиковые флаконы,
которые упаковывают поштучно в картонные коробки в комплекте с пипеткой и
инструкцией по применению.

3. Срок годности Ауризонa при соблюдении условий хранения в закрытой
упаковке – 24 месяца со дня изготовления, после вскрытия флакона – не более 2
месяцев.

Лекарственный препарат запрещается использовать по истечении срока
годности.

4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов
питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при
температуре от 15°С до 25°С.

5. Ауризон следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Специальных мер предосторожности при утилизации неиспользованного
препарата с истекшим сроком годности не требуется.

II. Фармакологические свойства

7. Ауризон относится к комбинированным противомикробным препаратам для
наружного применения.

Благодаря комбинации активных компонентов с разным механизмом действия,
препарат обладает широким спектром антибактериальной и фунгицидной
активности, оказывает противовоспалительное действие в очаге поражения.

Марбофлоксацин, входящий в состав препарата, относится к соединениям
группы фторхинолона, активен в отношении грамотрицательных и
грамположительных микроорганизмов, в том числе *S. intermedins*, *Ps.aeruginosa*,

coli, P. mirabilis. Механизм действия марбофлоксацина заключается в ингибировании синтеза ДНК микроорганизмов.

Клотримазол – фунгицидное соединение группы имидазола, изменяя проницаемость клеточной мембраны, вызывает разрушение клеточных элементов и ингибирует внутриклеточный молекулярный синтез. Активен в отношении дерматофитов и дрожжевых грибов, включая *Trichophyton* spp, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum audouini*, *Microsporum audouini*, *Microsporum canis*, *Microsporum gypseum*, *Malassezia pachydermatis*, *Candida* spp., *Aspergillus* spp., *Fusarium* spp., *Blastomyces dermatitis*, *Cryptococcus neoformans*.

Дексаметазон ацетат – синтетический глюкокортикостероид оказывает противовоспалительное и противоэкссудативное действие, способствует уменьшению зуда и заживлению поврежденных тканей.

Ауризон по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия.

III. Порядок применения

8. Ауризон назначают собакам для лечения отита бактериальной и грибковой этиологии.

9. Противопоказанием к применению Ауризона является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата, в том числе в анамнезе. Запрещается применение препарата животным при прободении барабанной перепонки.

10. Перед обработкой проводят гигиеническую обработку ушной раковины и наружного слухового прохода собаки. Флакон с лекарственным препаратом тщательно встряхивают, а затем закапывают Ауризон в каждое ухо по 5-10 капель (в зависимости от размера животного) и аккуратно массируют основание уха. Препарат применяют один раз в сутки до выздоровления животного, но не более 14 дней.

11. В случае если животное трясет головой после применения препарата, следует в течение нескольких минут фиксировать голову для предотвращения его разбрызгивания.

12. Симптомы передозировки у собак не выявлены.

13. Побочных явлений и осложнений при применении Ауризона в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного средства и проявлении аллергических реакций (кожный зуд, повышенная саливация) использование Ауризона прекращают.

14. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата его применение возобновляют в тех же дозировках и по той же схеме.

15. Применение Ауризона не исключает использование других этиотропных и патогенетических лекарственных средств.

IV. Меры личной профилактики

16. При проведении лечебных мероприятий с использованием Ауризона следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

17. При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его тотчас необходимо смыть струей воды, при попадании внутрь – обратиться к медицинскому врачу.

18. Запрещается использование пустых флаконов из-под лекарственного препарата для бытовых целей.

19. Организация-производитель: «Vetoquinol S.A.»; Magny-Vernois-B.P. 189-70204 Lure Cedex (France).

С утверждением настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению Ауризона, утвержденную Россельхознадзором 6 декабря 2005 года.

Инструкция разработана фирмой «Vetoquinol S.A.» совместно с ООО фирмой «МАРКВЕТ» (125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 66, стр. 1.)

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ».