

**Инструкция по применению гомеопатического препарата Лобелон
для лечения респираторных заболеваний у животных**
(Организация - разработчик: ООО «АлексАнн», Московская область)

I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: Лобелон (Lobelon).

Международное непатентованное наименование: Lobelia inflata, Apis mellifica, Kalium stibyltartaricum, Vincetoxicum, Atropa belladonna, Lycopodium clavatum, Psychotria ipecacuanha, Sambucus nigra, Kalium bichromicum, Ferrum phosphoricum, Echinacea purpurea, Acidum formicicum, Hepar sulfur.

Лекарственная форма: раствор для инъекций.

В качестве действующих веществ Лобелон содержит матричные настойки растительного и органического происхождения, и минеральные компоненты (в 1000 мл): Lobelia inflata Ø 0,15 мкл; Apis mellifica Ø=D1 0,1 мл; Echinacea purpurea Ø 15 мкл; Vincetoxicum Ø 0,02 мл; Atropa belladonna Ø 0,02 мл; Lycopodium clavatum Ø=D1 1 мкл; Psychotria ipecacuanha Ø=D1 1 мкл; Sambucus nigra Ø 15 мкл; Kalium bichromicum Ø=D2 0,5 мл; Kalium stibyltartaricum Ø=D2 5 пл; Ferrum phosphoricum D4 Trituration 0,5 г; Acidum formicicum Ø=D1 0,05 мл; Hepar sulfur D4 Trituration 0,01 г, а также в качестве вспомогательных компонентов: натрия хлорид 9,0 г; вода для инъекций до 1000 мл.

Выпускают Лобелон расфасованным по 10, 20, 50, 70, 100, 200 и 500 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, герметично укупоренные резиновыми пробками и обкатанные алюминиевыми колпачками.

Препарат хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°C до 25°C.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года с даты производства.

Запрещается применять по истечении срока годности.

II. Фармакологические свойства

Лобелон относится к комплексным гомеопатическим лекарственным препаратам.

Обладает противовоспалительным, противокашлевым, антибронхоконстрикторным действием, регулирует продукцию бронхиальной слизи, улучшает легочную вентиляцию. Входящие в состав лекарственного препарата в сверхмалых концентрациях биологически активные вещества растительного, минерального и органического происхождения стимулируют продукцию противовоспалительных цитокинов (ИЛ-10, ИЛ-4), регулируют процессы хемотаксиса и продукцию ряда биологически активных веществ (ИЛ-1-бета, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-альфа), играющих важную роль в развитии воспаления и бронхоспазма.

По степени воздействия на организм лекарственного средства Лобелон раствор для инъекций относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает местно-раздражающим и сенсибилизирующим действием.

III. Порядок применения

Лобелон назначают с лечебной целью животным при респираторных заболеваниях дыхательных путей, в том числе инфекционной этиологии: ринофарингите, ларингите, трахеобронхите; бронхиальной астме (в составе комплексной терапии).

Противопоказанием к применению Лобелона раствора для инъекций является индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Лобелон вводят внутримышечно или подкожно. В острых случаях 1-2 раза в сутки в течение 5-10 дней. При хронических заболеваниях 2-3 раза в неделю.

Длительность курса лечения устанавливается врачом, но не более 1 месяца.
При необходимости курс повторяется.

Разовая доза Лобелона на одно животное составляет:

- лошадям 5,0-8,0 мл;
- крупному рогатому скоту, свиньям - 5,0 мл;
- козам, овцам - 2,5 мл;
- жеребятам, телятам 2,5 мл;
- поросятам - 1 мл,
- собакам 1 мл/10 кг.

Симптомы передозировки у животных не установлены.

Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

В случае пропуска одной дозы препарата необходимо ввести ее как можно скорее. Далее интервал до следующего введения препарата не изменяется.

При применении Лобелона в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного в случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства, бета-адреномиметики, кортикоステроиды или другое симптоматическое лечение.

Применение Лобелона не исключает использования других лекарственных препаратов этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

Препарат предназначен для применения непродуктивным животным.

Сроки возможного использования продукции животноводства в период после применения Лобелона не регламентируются.

IV. Меры личной профилактики

При работе с Лобелоном следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы с препаратом следует вымыть руки теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Лобелона следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Запрещается использование пустых флаконов из-под препарата для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

Организация-производитель: ООО «АлексАнн», 147000, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д.13.

Место производства:

147000, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13;
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.

Дополнительная информация:

Схемы применения Лобелона в лечении болезней дыхательной системы у животных

Собаки, кошки, другие мелкие домашние животные:

Показания	Инъекции п/к или в/м
Ринит (насморк)	2-3 раза в день в течение 3-5 дней
Кашель и синдром бронхоконстрикции при бронхите, ларинготрахеите, бронхопневмонии, питомниковом кашле	1-2 раза в день в течение 7-14 дней
Бронхиальная астма	1 раз в день в течение 10 дней

Крупный рогатый скот:

Показания	Инъекции п/к или в/м
Бронхопневмония, бронхит	1. Лобелон - 5-7 инъекций 1 раз в сутки 2. Эвинтон - 1 раз в сутки до 5 дней 3. Лиарсин - 1 раз в сутки 1-2 инъекции 4. Этитропная терапия по показаниям
Гипоксия/асфиксия новорожденных	1-2 инъекции с интервалом 2-4 часа
Заболевания верхних дыхательных путей, сопровождающиеся сухим или влажным кашлем	1 раз в сутки, курс 5-7 инъекций

Лошади:

Показания	Способы применения
Бронхит	При остром бронхите: ежедневно 1 раз в день в течение 7 дней. При хроническом бронхите: ежедневно 1 раз в день в период обострения.
Бронхопневмония	Ежедневно 1 раз в день в течение недели. Затем в течение второй недели 1 раз в два дня
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)	В момент обострения: ежедневно 1 раз в день в течение 14 дней. Для профилактики обострения: курсами по 2 недели. Первая неделя 1 раз в день ежедневно. Вторая неделя – 1 раз в два дня. Затем перерыв от 2 до 3 месяцев.
Эмфизема легких	В момент обострения: ежедневно 1 раз в день в течение 14 дней. Для профилактики обострения: курсами по 2 недели. Первая неделя 1 раз в день ежедневно. Вторая неделя – 1 раз в два дня. Затем перерыв от 2 до 3 месяцев.