

Инструкция по применению препарата Стоп-цистит Био для нормализации и улучшения работы мочевыделительной системы у кошек и собак

(организация-производитель ООО НПО «Апи-Сан», Московская область)

I. Общие сведения

Стоп-цистит Био (Stop-cistit Bio) - кормовая добавка для нормализации и улучшения работы мочевыделительной системы у кошек и собак.

Стоп-цистит Био в качестве действующих веществ в 1 мл содержит сухие экстракты трав: горца птичьего - 5,0 мг, хвоща полевого - 5,0 мг, листьев крапивы - 5,0 мг, листьев брусники - 5,0 мг, листьев березы - 5,0 мг, корней солодки - 5,0 мг, плауна булавовидного - 5,0 мг, барбариса обыкновенного - 5,0 мг, золотарника канадского - 5,0 мг, а также вспомогательные компоненты: глицерин - 280 мг, натрия бензоат - 1,5 мг, сорбат калия - 1,5 мг, лимонную кислоту - 0,5 мг и воду очищенную - до 1 мл. Содержание суммы флавоноидов, в пересчете на рутин, не менее 0,04%, содержание суммы дубильных веществ в пересчете на танин, не менее 0,4%.

Не содержит генно-модифицированных продуктов.

По внешнему виду кормовая добавка представляет собой суспензию от светло-коричневого до темно-коричневого цвета. При хранении допускается расслоение суспензии, исчезающее при взбалтывании.

Выпускают Стоп-цистит Био расфасованным по 30, 50, 100 и 150 мл в полиэтиленовые флаконы соответствующей вместимости с навинчиваемыми крышками.

Флаконы упаковывают поштучно в картонную пачку вместе с инструкцией по применению и шприцем-дозатором.

Каждый флакон маркируют с указанием: наименования организации-производителя; наименования, назначения и способа применения кормовой добавки; состава и гарантируемых показателей; объема во флаконе; номера партии; срока и условий хранения; даты производства; надписи «Для животных»; надписи «Перед применением флакон тщательно встряхнуть».

На вторичную упаковку наносят маркировку с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака; названия, назначения и способа применения добавки; состава и гарантируемых показателей; объема кормовой добавки во флаконе; номера партии; регистрационного номера; срока и условий хранения; даты производства; информации о подтверждении соответствия: номера СТО, надписей «Для животных», «Перед применением флакон тщательно встряхнуть».

Хранят добавку в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0°С до 25°С.

Срок хранения при соблюдении условий хранения - 2 года со дня изготовления.

Стоп-цистит Био не должен применяться по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

Стоп-цистит Био, благодаря комплексу биологически активных веществ, содержащихся в экстрактах растений, обладает антисептическим, мочегонным, спазмолитическим, диуретическим свойствами и салуретическим действием, снижает вероятность образования камней в почках и мочевых путях, способствует растворению и выведению конкрементов при мочекаменной болезни.

Экстракты крапивы, солодки, брусники, барбариса оказывают мочегонное, спазмолитическое действие, способствуют уменьшению камнеобразования в почках и мочевом пузыре.

Трава горца птичьего, экстракт листьев березы и хвоща полевого повышают диурез,

выводят с мочой избыток ионов натрия и хлора, препятствуя образованию мочевых камней.

Плаун булавовидный и Золотарник канадский обладают антисептическими и диуретическими свойствами.

Применение Стоп-цистита Био снижает вероятность образования камней у собак и кошек и способствует их растворению и выведению из мочевых путей и мочевого пузыря, снижению болевого синдрома при мочекаменной болезни и более быстрому восстановлению работы мочевыделительной системы.

III. Порядок применения

Стоп-цистит Био применяют для нормализации и улучшения работы мочевыделительной системы у кошек и собак, а также в комплексе с лекарственными препаратами при урологическом синдроме, мочекаменной болезни и в послеоперационный период после удаления мочевых камней.

Препарат дают животным индивидуально в смеси с кормом или непосредственно на корень языка с помощью шприца-дозатора 2 раза в сутки, в течение 10 - 14 дней, в следующих дозах:

Вид и вес животного		Доза, мл/животное	
		суточная	разовая
кошки	до 5 кг	4,0	2,0
	от 5 кг	6,0	3,0
собаки	до 10 кг	4,0	2,0
	от 11 до 20 кг	6,0	2,0-3,0
	от 21 до 30 кг	8,0	3,0-4,0
	от 31 до 40 кг	12,0	4,0-6,0
	свыше 40 кг	16,0	6,0-8,0

Перед использованием флакон с кормовой добавкой следует тщательно встряхнуть в течение 1-2 минут.

Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

Противопоказаний для применения не выявлено.

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам кормовой добавки и появлении аллергических реакций использование кормовой добавки следует прекратить.

Стоп-цистит Био совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

IV. Меры личной профилактики

При работе со Стоп-циститом Био следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Хранить в местах, недоступных для детей.