

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению Беафар ошейника инсектоакарицидного  
для собак

(организация-разработчик фирма «Beaphar B.V.», Нидерланды)

**I. Общие сведения**

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Беафар ошейник инсектоакарицидный для собак (Beaphar collar insectoacaricidal for Dog).

Международное непатентованное наименование: Диазинон.

2. Лекарственная форма: инсектоакарицидный ошейник

Беафар ошейник инсектоакарицидный для собак содержит в качестве действующего вещества фосфорорганическое соединение диазинон (15%), а также вспомогательные компоненты - поливинилхлоридную смесь «С натурель» (82,1%), эпоксирированное соевое масло (1,4%), лаурат бария (0,6%), мятное масло (0,8%), краситель руспринтекс Е 153 или эритрозин ЛЕ-127 (0,1%).

По внешнему виду препарат представляет собой полихлорвиниловую ленту с фиксатором и насечками, которые способствуют моментальному расстегиванию ошейника и быстрому освобождению животного.

Выпускают Беафар ошейник инсектоакарицидный для собак средних, маленьких пород и щенков длиной 65 см; для собак крупных пород длиной 85 см, упакованным в герметично закрытом полимерном пакете, помещенном в картонную коробку с вместе с инструкцией по применению.

3. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 5<sup>0</sup>С до 30<sup>0</sup>С.

4. Срок годности Беафар ошейника инсектоакарицидного для собак при соблюдении условий хранения - 4 года со дня производства.

Запрещается использовать Беафар ошейник инсектоакарицидный для собак по истечении срока годности.

5. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный Беафар ошейник инсектоакарицидный для собак утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

**II. Фармакологические свойства**

Фармакологическая группа – инсектоакарицидное средство. Диазинон, входящий в состав ошейника, выделяясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосистой покров животного и оказывает контактное инсектоакарицидное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), вшей (*Linognathus setosus*), власоедов (*Trichodectes canis*) и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках.

Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме насекомых (вшей, кровососок и др.) и клещей (саркоптоидных, иксодовых), в результате чего происходит паралич и гибель эктопаразитов.

Беафар ошейник для собак и щенков по степени воздействия на организм животных относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не оказывает резорбтивно-токсического, местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

### III. Порядок применения

8. Беафар ошейник инсектоакарицидный для собак применяют собакам и щенкам старше 6-месячного возраста, для уничтожения блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей.

9. Беафар ошейник инсектоакарицидный для собак не следует применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, кормящим и беременным собакам, а также щенкам моложе 6-месячного возраста.

10. После вскрытия упаковки ошейник разворачивают и надевают на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0–1,5 см, затем закрепляют фиксатором, и излишек ленты срезают.

В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей на животное, но через 2-3 дня паразиты самопроизвольно отпадают.

Постоянное ношение Беафар ошейника инсектоакарицидного для собак обеспечивает защиту собак от насекомых и иксодовых клещей не менее 5 месяцев.

При сильной степени заражения животного насекомыми перед применением Беафар ошейник инсектоакарицидного для собак животное целесообразно вымыть инсектицидным шампунем, а подстилки обработать инсектицидным средством в соответствии с инструкциями по применению.

11. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

12. Особенности действия в начале ношения ошейника и при его снятии не установлено.

13. Беафар ошейник инсектоакарицидный для собак применяется однократно.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Беафар ошейника инсектоакарицидного для собак в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к диазинону, возможны индивидуальные реакции (избыточная слювация, слезотечение, признаки раздражения кожи), в этих случаях использование ошейника прекращают, животное следует вымыть с мылом и ополоснуть шерсть большим количеством проточной воды, а при необходимости назначить антигистаминные и симптоматические средства.

15. Не следует одновременно применять другие инсектоакарицидные препараты.

16. Беафар ошейник инсектоакарицидный для собак не предназначен для применения продуктивным животным.

#### IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Беафар ошейником инсектоакарицидным для собак необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы с лекарственным препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

18. Владельцу животного при наличии на руках порезов и ссадин при манипуляциях с Беафар ошейником инсектоакарицидным для собак следует пользоваться резиновыми перчатками. Животное с Беафар ошейником инсектоакарицидным для собак не следует подпускать к маленьким детям, особенно к грудным младенцам.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Беафар ошейником инсектоакарицидным для собак. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: фирма «Beaphar B.V.»; P.O. Box 7, 8100 AA Raalte, Holland.

Инструкция разработана компанией «Beaphar Eastern Europe, s.r.o.» (Чешская Республика) совместно с фирмой «Beaphar B.V.» (Нидерланды).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Беафар ошейника инсектоакарицидного для собак, утвержденная Россельхознадзором 02.12.2008 г.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Представитель компании  
«Beaphar Eastern Europe, s.r.o.», Чехия

Кинкор Маджумдер С.