

**Инструкция по применению Энроксила в таблетках со вкусом мяса
для лечения собак и кошек при болезнях бактериальной этиологии
(организация-разработчик «KRKA, d.d., Novo mesto», Словения)**

Утверждена 19 марта 2015 года.

I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: таблетки со вкусом мяса (Enroxil® tablets with meat flavour).

Международное непатентованное наименование: энрофлоксацин.

Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Энроксил таблетки выпускают в 3 дозировках: массой 0,055 г, 0,183 г и 0,55 г.

В 1 таблетке в качестве действующего вещества препарат содержит энрофлоксацин соответственно 15 мг, 50 мг и 150 мг, а в качестве вспомогательных веществ: маннитол - 18,4; 61,3 и 184,0 мг, кукурузный крахмал - 5,7; 19,0 и 57,0 мг, натрия крахмала гликолят - 3,3; 11,0 и 33,0 мг, ароматизатор с запахом мяса 10022 - 5,0; 16,6 и 50,0 мг, сополимер метакриловой кислоты - 3,5; 11,7 и 35,0 мг, натрия лаурилсульфат - 0,6; 2,0 и 6,0 мг, дибутилсебацинат - 0,6, 2,0 и 6,0 мг, натрия кроскармеллозу - 1,0; 3,3 и 10,0 мг, кремния диоксид коллоидный - 0,15; 0,5 и 1,5 мг, тальк - 1,25; 4,2 и 12,5 мг и магния стеарат - 0,5, 1,7 и 5,0 мг.

По внешнему виду препарат представляет собой круглые, слегка двояковыпуклые светло-коричневого цвета таблетки с белыми или темными вкраплениями, с риской на одной стороне и со скошенной кромкой.

Таблетки Энроксила выпускают расфасованными в блистеры по 10 штук. Блистеры упакованы в коробки по 1 или 10 штук. Каждую коробку снабжают инструкцией по применению.

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°C до 25°C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 3 года с даты производства.

Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности.

Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

Энроксил таблетки со вкусом мяса относится к антибактериальным препаратам группы фторхинолонов.

Энрофлоксацин, входящий в состав препарата, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus hyicus*, *Streptococcus* spp., *Klebsiella* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, *Bordetella bronchiseptica*, *Campylobacter* spp., *Corynebacterium pyogenes*, *Proteus* spp., *Mycoplasma* spp., *Brucella canis*, *Actinobacillus* spp., *Listeria monocytogenes*, *Haemophilus* spp., *Clostridium perfringens*.

Механизм действия энрофлоксацина заключается в ингибировании активности фермента гиразы, влияющего на репликацию спирали ДНК в ядре бактериальной клетки.

После перорального введения энрофлоксацин хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает в большинство органов и тканей организма. Его максимальная концентрация в крови достигается через 1,5-2,0 часа и удерживается на

терапевтическом уровне на протяжении 24 часов. Выделяется энрофлоксацин из организма животных в основном в неизмененном виде с мочой и желчью.

Энроксил по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

Энроксил таблетки применяют для лечения собак и кошек при заболеваниях органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, инфекций мягких тканей и отитов, инфицированных ран и других заболеваний бактериальной и микоплазменной этиологии, возбудители которых чувствительны к энрофлоксацину.

Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к фторхинолонам и другим компонентам препарата.

Запрещается применение таблеток Энроксила котятм моложе 2 месяцев, щенкам моложе 12 месяцев (щенкам крупных пород - моложе 18 месяцев), а также животным при существенных нарушениях развития хрящевой ткани и поражениях центральной нервной системы, сопровождающихся судорогами.

Энроксил таблетки применяют собакам и кошкам перорально индивидуально в раздробленном виде с кормом или вводят принудительно на корень языка в суточной дозе 5 мг энрофлоксацина на 1 кг массы животного, что составляет:

- одна таблетка массой 0,055 г (15 мг энрофлоксацина) на 3 кг массы животного,
- одна таблетка массой 0,183 г (50 мг энрофлоксацина) на 10 кг массы животного,
- одна таблетка массой 0,55 г (150 мг энрофлоксацина) на 30 кг массы животного.

Суточную дозу препарата можно разделить на два приема. Продолжительность курса лечения составляет 5-10 суток.

При передозировке препарата у животных может наблюдаться снижение аппетита, угнетенное состояние, рвота, диарея, нервные расстройства.
Лечение симптоматическое.

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

Следует избегать пропуска введения очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

При применении таблеток Энроксила в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

В редких случаях возможны рвота, учащение дефекации и размягчение фекалий, указанные симптомы самопроизвольно исчезают и не требуют отмены препарата. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные и симптоматические препараты.

Не следует применять Энроксил таблетки со вкусом мяса одновременно с хлорамфениколом, макролидами, теофиллином, нестероидными противовоспалительными средствами, а также с препаратами, содержащими катионы железа, кальция, магния, алюминия, ухудшающими всасывание лекарственных средств в желудочно-кишечном тракте.

Энроксил таблетки не предназначены для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

При работе с Энроксилем необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Людям с гиперчувствительностью к фторхинолонам следует избегать прямого контакта с препаратом. При случайно попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо тотчас смыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.