



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Прак-тик®**

(Организация-разработчик: «Elanco Europe Ltd.»; Form 2 Bartley Way, Bartley Wood Business Park, Hook, RG27 9XA United Kingdom / «Эланко Юроп Лтд.»; Форм 2, Бартли Уэй, Бартли Вуд Бизнес Парк, Хук, RG27 9XA, Великобритания)

Номер регистрационного удостоверения: 705-3-4.14-3041 №ПВИ-3-3.8/02666

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: торговое наименование: Прак-тик® (Prac-tic®); международное непатентованное наименование действующего вещества: пирипрол.
2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения. Прак-тик® содержит в 1 мл действующее вещество пирипрол – 12,5 % (125 мг) и вспомогательные вещества: бутилгидрокситолуол и диэтилглицольмоноэтиловый эфир.
3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный бесцветный или желтого цвета раствор.
- Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 5 лет со дня производства. Не применять по истечении срока годности.
4. Выпускают препарат расфасованным по 0,45; 1,1; 2,2 и 5,0 мл в полипропиленовые пипетки, упакованные по 3 штуки в блистеры из алюминиевой фольги, помещенные в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.
5. Хранят Прак-тик® в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре не выше 25 °С.
6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Прак-тик® относится к инсектоакарицидным лекарственным препаратам группы фенилпиразола.

10. Пирипрол, входящий в состав Прак-тик[®], оказывает выраженное инсектицидное и акарицидное действие в отношении имагинальных и преимагинальных фаз развития паразитирующих на собаках насекомых, включая блох (*Ctenocephalides canis*), вшей (*Linognathus setotus*) и власоедов (*Trichodectes canis*), а также иксодовых клещей – *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*, *Ixodes scapularis*, *Dermacentor variabilis*, *Amblyomma americanum*.

Механизм действия пирипрола основан на взаимодействии с каналами хлора, включая зависимые от нейромедиатора гамма-аминомасляной кислоты (GABA), что блокирует пре- и постсинаптический перенос ионов хлора через мембраны клеток. Это приводит к нарушению передачи нервных импульсов, вызывая гибель насекомых и иксодовых клещей.

После капельного нанесения препарата на кожу пирипрол, практически не всасываясь в системный кровоток, постепенно распределяется по поверхности тела, оказывая контактное инсектоакарицидное действие.

Прак-тик[®] по степени воздействия на организм относится к «умеренно опасным» веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает кожно-раздражающими и резорбтивно-токсическими свойствами; в рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического и тератогенного действия. Хорошо переносится собаками разных пород и возраста. Препарат токсичен для пчел, а также рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. Прак-тик[®] применяют с целью уничтожения блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках, а также для защиты животных от их нападения.

12. Противопоказанием к применению Прак-тик[®] является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата, в том числе в анамнезе. Не разрешается применять Прак-тик[®] больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, собакам массой менее 2 кг и щенкам моложе 8-недельного возраста.

13. При работе с Прак-тик[®] следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. После работы с препаратом следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

Пустую упаковку из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Не следует гладить места нанесения препарата и подпускать животное к маленьким детям в течение 24 часов после обработки Прак-тик[®].

Людьми с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Прак-тик[®].

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата и/или этикетку).

14. Обработку ценных и кормящих сук при необходимости следует проводить под наблюдением ветеринарного врача.

Не допускается применение Прак-тик® щенкам моложе 8-недельного возраста.

15. Препарат применяют путем капельного («spot-on») нанесения на сухую неповрежденную кожу животного.

Для уничтожения блох и клещей обработку собак проводят однократно, для предупреждения повторной инфекации на протяжении всего сезона активности паразитов – по показаниям, но не чаще одного раза в месяц. При терапии аллергического дерматита, вызванного насекомыми, препарат целесообразно использовать в сочетании с лекарственными препаратами патогенетической и симптоматической терапии.

Перед использованием у пипетки отламывают кончик, затем, раздвинув шерсть и, нажимая на пипетку, препарат наносят животному непосредственно на кожу в места, недоступные для слизывания – между лопатками у основания шеи. При обработке крупных животных содержимое пипеток наносят на кожу в 2–3 точки вдоль линии спины.

Минимальная терапевтическая доза препарата Прак-тик® составляет 0,1 мл на 1 кг массы животного, что эквивалентно 12,5 мг пирипрола на 1 кг массы животного.

В зависимости от массы собаки используют Прак-тик® различной фасовки в дозах, указанных в таблице:

| Масса животного | Доза на животное – номинальный объем пипетки, мл | Пирипрол, мг | Доза пирипрола, мг/кг массы животного |
|---------------------|--|--------------|---------------------------------------|
| от 2,0 кг до 4,5 кг | 0,45 | 56,25 | 12,5 – 28,1 |
| от 4,5 кг до 11 кг | 1,1 | 137,5 | 12,5 – 30,6 |
| от 11 кг до 22 кг | 2,2 | 275 | 12,5 – 25,0 |
| от 22 кг до 50 кг | 5,0 | 625 | 12,5 – 28,4 |
| более 50 кг | комбинация пипеток* | | |

*При обработке собак массой более 50 кг Прак-тик® применяют в дозе 0,1 мл на каждый кг массы животного, используя комбинацию пипеток различной фасовки.

Не следует наносить препарат на влажную или поврежденную кожу, мыть животное с моющим средством в течение 48 часов перед обработкой, а также купать в водоемах в течение 24 часов после обработки препаратом.

16. При применении Прак-тик® в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. В редких случаях после применения препарата у некоторых животных наблюдаются

индивидуальные реакции кожи (покраснение, зуд), которые самопроизвольно проходят в течение 1–4 дней и не требуют применения лекарственных средств.

17. При передозировке лекарственного препарата у животного могут отмечаться неврологические симптомы: ухудшение координации движений, тремор, одышка, гиперсаливация (при слизывании препарата), которые самопроизвольно исчезают в течение нескольких часов и не требуют применения лекарственных средств.

18. Прак-тик® не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными средствами для обработки животных.

19. Особенности действия при первом применении лекарственного препарата и его отмене не установлено.

20. В случае пропуска очередной профилактической обработки животного в сезон активности эктопаразитов препарат следует ввести как можно скорее в той же дозе.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса
производственных площадок
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения:

Организация, осуществляющая
производство:

«Dottikon Exclusive Synthesis AG»;
Hembrunnstrasse 17, CH-5605 Dottikon,
Switzerland / «Доттикон Эксклюзив
Синтезис АГ»; Хембруннштрассе 17,
CH-5605 Доттикон, Швейцария.

Организация, осуществляющая
фасовку, упаковку, контроль качества и
выпуск готовой продукции:

«Klocke Verpackungs-Service
GmbH»; Max Becker Strasse 6, D-76356
Weingarten, Germany / «Клокке
Ферпаккунгс-Зерфице ГмбХ»; Макс
Беккер Штрассе 6, D-76356 Веингартен,
Германия.

Наименование, адрес
организации, уполномоченной
держателем или владельцем
регистрационного удостоверения
лекарственного препарата на
принятие претензий от
потребителя:

ООО «Эланко Рус», 123112,
Россия, г. Москва, Пресненская
набережная, д. 10, эт. 16, пом. 1Б,
ком. 13.

Специалист по регистрации
ООО «Эланко Рус»



Е.С. Бугаева