

**Инструкция по применению таблеток Милпразон для кошек
для лечения и профилактики нематодозов и цестодозов
(организация-разработчик «KRKA, d.d., Novomesto», Словения)
Утверждена 22 октября 2014 года.**

I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: **Милпразон таблетки для кошек** (Milprazon® tabletsforcats).

Международное непатентованное наименование: **мильбемицинаоксим, празиквантел.**

Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Милпразон таблетки для кошек в качестве действующих веществ содержат мильбемицинаоксим и празиквантел.

Выпускают препарат в двух модификациях: для котят и кошек весом до 2 кг с содержанием мильбемицинаоксима - 4 мг/табл. и празиквантела - 10 мг/табл. и вспомогательных веществ: микрокристаллической целлюлозы - 32,98 мг, моногидрата лактозы - 75,37 мг, повидона - 0,75 мг, кроскармеллозы натрия - 5,50 мг, кремния коллоидного безводного - 0,90 мг, магния стеарата - 2,50 мг, Опадрай белого - 3,20 мг, мясного ароматизатора - 0,40 мг, сухих дрожжей - 0,20 мг, железа оксида желтого E172 - 0,20 мг; и для кошек весом более 2 кг с содержанием мильбемицинаоксима - 16 мг/табл. и празиквантела - 40 мг/табл. и вспомогательных веществ: микрокристаллической целлюлозы - 20,80 мг, моногидрата лактозы - 41,50 мг, повидона - 3 мг, кроскармеллозы натрия - 7 мг, кремния коллоидного безводного - 1,20 мг, магния стеарата - 2,50 мг, Опадрай белого - 3,20 мг, мясного ароматизатора (AromaMeatFlavour 10022) - 0,40 мг, сухих дрожжей - 0,20 мг, железа оксида красного E172 - 0,20 мг.

По внешнему виду Милпразон таблетки для кошек в модификации для котят и кошек весом до 2 кг представляют собой коричнево-желтые овальные двояковыпуклые таблетки со вкусом мяса, покрытые пленочной оболочкой, с риской на одной стороне; а в модификации для кошек весом более 2 кг - коричнево-красные овальные двояковыпуклые таблетки со вкусом мяса, покрытые пленочной оболочкой, с риской на одной стороне.

Препарат выпускают расфасованным по 2 и 4 таблетки в блистеры, упакованные в картонные коробки в комплекте с инструкцией по применению.

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5°C до 25°C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 2 года с даты производства.

Неиспользованную половину таблетки можно поместить в блистер и хранить до следующей дегельминтизации, но не более 6 месяцев после вскрытия упаковки.

Запрещается использование лекарственного препарата по истечении срока годности.

Милпразон таблетки для кошек следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

Милпразон таблетки для кошек относятся к группе комбинированных антигельминтных препаратов нематодоцидного и цестодоцидного действия.

Входящие в состав препарата активные компоненты обеспечивают его широкий спектр антигельминтного действия.

Мильбемицинаоксим - макроциклический лактон, получаемый в результате ферментативной деятельности *Streptomyceshygroscopicus* var. *Aureolacrimosus*, активен в отношении личинок и имаго нематод, паразитирующих в желудочно-кишечном тракте кошек, а также личинок нематоды *Dirofilariaimmitis*.

Механизм действия мильбемицина обусловлен повышением проницаемости клеточных мембран для ионов хлора (СГ), что приводит к гиперполяризации мембран клеток нервной и мышечной ткани, параличу и гибели паразита. После перорального введения препарата максимальная концентрация мильбемицинаоксида в плазме крови кошек достигается через 2 часа, из организма соединение выводится в основном в неизмененном виде, период полувыведения составляет около 13 часов.

Празиквантел является ацилированным производным пиразинизохинолина, обладает выраженным действием против цестод и нематод. Повышая проницаемость клеточных мембран паразита для ионов кальция (Ca^{2+}), вызывает деполяризацию мембран, сокращение мускулатуры и разрушение тегумента, что приводит к гибели паразита и способствует его выведению из организма животного. После перорального введения препарата максимальная концентрация празиквантела в плазме крови кошек достигается через 1 час, из организма соединение выводится в основном в виде неактивных метаболитов с мочой, период полувыведения составляет около 3 часов.

Милпразон таблетки для кошек по степени воздействия на организм относятся к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают сенсibilизирующего, эмбриотоксического и тератогенного действия, хорошо переносятся кошками разных пород и возраста.

Препарат токсичен для пчел, а также рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

Милпразон таблетки для кошек назначают с лечебной и профилактической целью при нематодозах, цестодозах и ассоциативных нематодо-цестодозных инвазиях, вызванных как личиночными формами, так и половозрелыми цестодами и нематодами следующих видов:

- цестоды - *Dipylidiumcaninum*, *Taenia* spp., *Echinococcusmultilocularis*;
- нематоды - *Ancylostomatubaeforme*, *Toxocaracati*, *Dirofilariaimmitis* (профилактика заболеваний).

Противопоказанием к применению Милпразона является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе), выраженные нарушения функции почек и печени.

Не следует применять препарат котятм моложе 6-недельного возраста и массой менее 0,5 кг. Не подлежат дегельминтизации истощенные и больные инфекционными болезнями животные.

Дегельминтизацию беременных и кормящих кошек при необходимости проводят под наблюдением ветеринарного врача.

Препарат применяют кошкам однократно во время кормления с небольшим количеством корма или вводят принудительно на корень языка после кормления в минимальной терапевтической дозе 2 мг мильбемицинаоксида и 5 мг празиквантела на 1 кг массы животного, из расчета:

Милпразон таблетки для кошек		
Вес кошки, кг	для котят и кошек весом до 2 кг (коричнево-желтые таблетки с содержанием мильбемицина оксима 4 мг и празиквантела 10 мг), шт.	для кошек весом более 2 кг (коричнево-красные таблетки с содержанием мильбемицина оксима 16 мг и празиквантела 40 мг), шт.
0,5-1	1/2	
1-2	1	
2-4		1/2
4-8		1
8-12		1 ^{1/2}

Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств перед дегельминтизацией не требуется.

С лечебной целью кошек дегельминтизируют по показаниям, с профилактической целью - ежеквартально, а также перед каждой вакцинацией и случкой в терапевтической дозе.

Однократный прием препарата с целью дегельминтизации защищает кошек от заражения *Dirofilaria immitis* в течение одного месяца. Для последующей профилактики диروفилариоза целесообразно применять препарат с содержанием одного действующего вещества мильбемицина оксима.

При передозировке препарата у кошек могут наблюдаться вялость, атаксия, тремор мышц, рвота и/или диарея. Симптомы самопроизвольно исчезают в течение суток, при необходимости животному назначают средства симптоматической терапии.

Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

При проведении дегельминтизации следует придерживаться рекомендуемых инструкцией сроков. В случае пропуска очередной обработки применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

Побочных явлений и осложнений при применении препарата согласно настоящей инструкции, как правило, не наблюдается.

В редких случаях, чаще у котят, могут наблюдаться вялость, атаксия, тремор мышц, рвота и/или диарея. В этом случае животному назначают средства симптоматической терапии.

Милпразон таблетки для кошек совместимы с селамектином, сведения о совместимости препарата с другими макроциклическими лактонами отсутствуют.

Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

При работе с Милпразоном необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Милпразоном таблетками для кошек. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

