

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по ветеринарному применению лекарственного препарата Мексидол-Вет®

(организация – разработчик: ООО «НПК «ФАРМАСОФТ»,  
Россия, 115407, город Москва, улица Судостроительная,  
дом 41, этаж 1, помещение 12)

Номер регистрационного удостоверения  
77-3-6.15-4443 №ПВР-3-5.6/01732

**I. Общие сведения**

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мексидол-Вет®  
Группировочное наименование: Этилметилгидроксиридина сукцинат.
2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.  
Состав на 1 мл:  
Действующее вещество: Этилметилгидроксиридина сукцинат – 25 мг или 50 мг;  
Вспомогательное вещество: вода для инъекций до 1мл.
3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную бесцветную или слегка желтоватую жидкость  
Срок годности препарата- 3 года. Не применять по истечении срока годности.
4. Препарат выпускают по 1 мл (раствор для инъекций с концентрацией 25 мг/мл), 2 мл и 5 мл (раствор для инъекций с концентрацией 50 мг/мл) в ампулах из стекла с точкой разлома белого цвета и тремя маркировочными кольцами (верхнее – желтое, среднее – белое, нижнее – красное). На ампулу наклеивают этикетку самоклеящуюся. По 5 ампул упаковывают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной. По одной контурной ячейковой упаковке (для фасовки по 5 мл) или по две контурные ячейковые упаковки (для фасовок по 1 мл и 2 мл) вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
5. Условия хранения:  
Препарат хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 2 °C до 25 °C.
6. Мексидол-Вет® следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

## **II. Фармакологические (биологические) свойства**

9. Мексидол-Вет<sup>®</sup> относится к фармакотерапевтической группе антигипоксантов и антиоксидантов.

10. Мексидол-Вет<sup>®</sup> обладает выраженными антиоксидантными, антигипоксическими и мембранопротекторными свойствами. Препарат повышает устойчивость организма к воздействию свободных радикалов, приводящих к кислородозависящим патологическим состояниям (шок, гипоксия, ишемия), улучшает микроциркуляцию и реологические свойства крови, стабилизирует мембранные структуры тромбоцитов и эритроцитов при гемолизе, обладает гиполипидемическим действием, снижает содержание общего холестерина и липопротеидов низкой плотности.

Мексидол-Вет<sup>®</sup> ингибирует перекисное окисление липидов, повышает активность супероксиддисмутазы, улучшает синаптическую передачу и транспорт медиаторов.

Механизм действия препарата заключается в способности вызывать усиление компенсаторной активации аэробного гликолиза и снижать степень угнетения окислительных процессов в цикле Кребса в условиях гипоксии, с увеличением содержания АТФ и креатинфосфата; активизировать энергосинтезирующую функцию митохондрий.

При парентеральном введении препарат быстро поступает в кровь, органы и ткани животного. Выводится из организма преимущественно с мочой, в основном в глукуроноконъюгированной форме.

Мексидол-Вет<sup>®</sup> по степени воздействия на организм относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает место-раздражающими, кумулятивными, эмбриотоксическими и тератогенными свойствами.

## **III. Порядок применения**

11. Мексидол-Вет<sup>®</sup> назначают собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью самостоятельно и в комплексной терапии:

- при острой и хронической сердечно-сосудистой и легочной недостаточности;
- при интоксикациях, вызванных острыми гнойно-воспалительными процессами (острый некротический панкреатит, перитонит);
- с целью профилактики наркозных и постнаркозных осложнений, в посттравматический и послеоперационный периоды, в том числе при черепно-мозговых травмах;
- при патологии кожных покровов (дерматиты, экземы, трофические язвы, раны), для улучшения состояния кожно-волосяного покрова;
- в ветеринарной гериатрии при возрастных нарушениях функций организма.

12. Противопоказания для применения: острые нарушения функции печени и почек, повышенная индивидуальная чувствительность к препарату.

13. При работе с препаратом Мексидол-Вет<sup>®</sup> следует соблюдать общие правила техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Мексидол-Вет<sup>®</sup>. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата).

14. Применение препарата беременным и кормящим животным, щенкам и котятам до 2-х месячного возраста при необходимости проводят под наблюдением ветеринарного врача.

15. Терапевтическая доза лекарственного препарата зависит от тяжести клинического состояния животного. В острый период заболевания препарат применяют начиная с дозы 10-15 мг на 1 кг массы животного, затем её снижают до 5 мг на 1 кг массы животного. Курс лечения составляет 5 - 15 дней.

В целях профилактики наркозных и постнаркозных осложнений препарат применяют за 2-3 дня до операции, в постоперационный период – в течение 2-3 дней после операции два раза в день в дозе 10-15 мг на 1 кг массы животного. При длительном наркозе, тяжелом клиническом состоянии животного препарат вводят в период операции дробно в дозировке 20 мг на 1 кг массы животного.

В качестве лечебно-профилактического средства в ветеринарной гериатрии Мексидол-Вет<sup>®</sup> применяют собакам и кошкам старше 7 лет внутримышечно в дозе 10 мг на 1 кг массы животного два раза в сутки в течение 5-7 дней с интервалом 3 - 4 месяца.

Мексидол-Вет<sup>®</sup> вводят собакам и кошкам внутримышечно или внутривенно. При внутривенном способе введения препарат разводят водой для инъекций или физиологическим раствором в 2 и более раза.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. Внутривенное введение лекарственного препарата может сопровождаться болезненностью.

17. При передозировке возможно развитие сонливости. Лечение: симптоматическая терапия.
18. Применение препарата Мексидол-Вет® не исключает использования других лекарственных средств патогенетической и симптоматической терапии.
19. Особеностей действия при первом приеме препарата или при его отмене не выявлено.
20. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс лечения необходимо возобновить в соответствии с предусмотренной схемой применения и дозировками.
21. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения:

ФКП «Армавирская биофабрика»,  
Россия, 352212, Краснодарский край,  
Новоокубанский район,  
пос. Прогресс, ул. Мечникова, д.11.  
Тел: +7 (86195) 2-12-11  
Тел./факс: +7 (86195) 2-15-25

Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя:

ООО «НПК «ФАРМАСОФТ», Россия, 115407, город Москва,  
улица Судостроительная, дом 41,  
этаж 1, помещение 12  
Тел./факс: +7 (495) 626-47-55