

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Алюминиум-спрея (Aluminium-Spray)

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

Алюминиум-спрей содержит в качестве действующего вещества порошок алюминия.

Представляет собой суспензию для наружного применения серебристого цвета.

Выпускают в алюминиевых аэрозольных флаконах с механическим распылителем по 300 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Алюминиум-спрей обладает **антисептическими, противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами**. При нанесении на пораженную область образует плотную пленку, предотвращающую повторную бактериальную контаминацию и вредное влияние окружающей среды. Препарат обладает подсушивающим эффектом.

ПОКАЗАНИЯ

Назначают крупному рогатому скоту, лошадям, овцам, свиньям, собакам и кошкам для лечения ран различного происхождения и кожных заболеваний, а также для обработки послеоперационных ран.

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением препарата необходимо удалить с обрабатываемой поверхности загрязнения, некротизированные ткани, гной и раневой экссудат. Перед использованием флакон с препаратом следует хорошо встряхнуть и распылять с расстояния 20 – 25 см от пораженного участка в течение 1 – 2 секунд. Препаратору дают впитаться в течение 3 минут, не позволяя животному слизывать образовавшуюся пленку. Алюминиум-спрей применяют 1 – 2 раза в сутки. Курс лечения зависит от тяжести раны и скорости ее заживления, но не должен превышать 10 дней.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

При правильном использовании и дозировке побочные явления, как правило, не наблюдаются. В случае возникновения побочных явлений следует прекратить применение препарата, промыть обработанные участки и применять симптоматическое лечение.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Ограничений по срокам убоя сельскохозяйственных животных на мясо и использованию молока в пищевых целях нет. В случаях вынужденного убоя необходимо удалить и утилизировать участок тела, подвергавшийся лечению препаратом. При обработке повреждений в области головы следует защищать глаза животного от попадания препарата. Содержимое флакона не распылять вблизи огня и нагревательных приборов. Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагревания флакона выше 50 °C.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей и животных месте при температуре от 15 до 20 °C. Срок годности — 3 года.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Никовет (Nicovet), Германия.