

Фиприст Спот Он - раствор для наружного применения против эктопаразитов

В качестве действующего вещества содержит: фипронил - 10%.

Вспомогательные вещества: повидон - 5%, полисорбат - 8%, бутилгидроксианизол - 0.02%, бутилгидрокситолуен - 0.01%, диметилсульфоксид - до 100%.

Расфасован по 0.5, 0.67, 1.34, 2.68 и 4.02 см³ в полиэтиленовые пипетки. Пипетки упаковывают в картонные коробки по 3 штуки.

Свойства препарата

Инсектоакарицидный препарат контактного действия. Блокирует рецепторы ГАМК, что приводит к параличу и гибели паразита.

Фиприст обладает выраженным инсектицидным и акарицидным действием в отношении всех фаз развития вшей, блох, власоедов и клещей (иксодовые, хейлителлы, отодектосы), паразитирующих на собаках и кошках.

Фиприст не обладает системным действием, он накапливается в сальных железах животного и оказывает контактное инсекто-акарицидное действие.

После нанесения Фиприста на кожу, препарат в течение 24 ч постепенно распределяется по всей поверхности тела и обеспечивает защиту животного от эктопаразитов.

Фиприст Спот Он по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). При попадании в глаза вызывает слабое раздражение, токсичен для кроликов, рыб и других гидробионтов.

Показания к применению

— уничтожение блох, вшей, власоедов и клещей (иксодовых, хейлителл, отодектосов), паразитирующих у собак и кошек.

Порядок применения

Фиприст применяют собакам и кошкам путем однократного топикального нанесения препарата на сухую неповрежденную кожу.

Перед обработкой у пипетки откручивают кончик, раздвигают у животного шерсть в области спины (между лопатками) и, нажимая на пипетку, наносят препарат на кожу в

одну или несколько точек в следующих дозах:

Вид животного, масса (кг)	Объем используемой пипетки (мл)/содержание фипронила (мг)	Количество пипеток
Собаки		
2-10	0.67/67	1
10-20	1.34/134	1
20-40	2.68/268	1
более 40	4.02/402	1
Кошки	0.5/50	1

Продолжительность защитного действия Фиприста против иксодовых клещей: у кошек - 15-21 день, у собак - до 1 месяца.

Продолжительность защитного действия препарата от блох: у кошек - до 1.5 месяца, а у собак - 2-2.5 месяца.

Повторные обработки животных проводят по показаниям, но не чаще одного раза в 3 недели.

Применение Фиприста для лечения ушного клеща (отодектоза)

Для лечения отодектоза препарат закапывают в каждое ухо по 4-6 капель (капли обязательно вводят в оба уха).

Для равномерного распределения препарата ушную раковину складывают пополам и слегка массируют ее основание. Остаток препарата в используемой пипетке (в расчете на массу животного) наносят на кожу между лопаток (однократная обработка).

Препарат не разрешается применять при прободении барабанной перепонки.

Побочные эффекты

Побочных явлений и осложнений при применении препарата по показаниям в рекомендуемых дозах не установлено.

Противопоказания

Запрещено применение:

щенкам и котятам моложе 8-недельного возраста;

ослабленным и больным животным;

совместно с другими инсекто-акарицидными средствами;

животным с повышенной индивидуальной чувствительностью к ингредиентам препарата.

Особые указания

Не рекомендуется мыть животных или купать в природных водоемах в течение 48 ч после обработки препаратом.

Во время работы с препаратом запрещается пить, курить, принимать пищу.

При случайном попадании Фиприста Спот Он на кожу или слизистые оболочки его следует снять тампоном и тщательно смыть струей воды. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

Коробки и пипетки из-под использованного препарата помещают в целлофановый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

При утилизации неиспользованного лекарственного препарата следует избегать попадания его в водоемы, ввиду его высокой токсичности для гидробионтов.

Условия и сроки хранения

Препарат следует хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре от 0° до 25°C.

Срок годности - 3 года.