

Барс спрей инсектоакарицидный для кошек, фл. 100 мл

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

Раствор для наружного применения, прозрачный, от бесцветного до светло-желтого цвета, со слабым специфическим запахом, в качестве действующего вещества содержит фипронил – 3.1 мг/мл, а также глицерин, касторовое масло и другие вспомогательные компоненты. Выпускают препарат расфасованным по 100 и 200 мл, в полиэтиленовые флаконы соответствующей вместимости с механическими распылительными головками, которые упаковывают в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Спрей «Барс» эффективен против блох, вшей, волосовиков (власоедов), иксодовых и саркоптоидных клещей, паразитирующих на собаках и кошках. Препарат обладает системным и контактным действием, вызывая гибель паразитов сразу после их нападения на обработанное животное. Спрей имеет приятный запах и оказывает репеллентное действие.

ПОКАЗАНИЯ

Для обработки собак и кошек при энтомозах, нотоэдрозе, саркоптозе, поражении животных иксодовыми клещами, а также для предотвращения нападения эктопаразитов на животных.

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием баллон встряхивают и с расстояния 20 см наносят препарат на животное, последовательно обрабатывая ушные раковины, грудь, шею, туловище, ноги, хвост. Избегать попадания препарата в глаза, рот и нос! При обработке собак и кошек длинношерстных пород препарат наносят по направлению «против шерсти» на кожу и основание волоса. С лечебной целью препарат применяют однократно. С профилактической целью кошек обрабатывают по показаниям, но не чаще 1 раза в месяц. У собак профилактику против клещей проводят 1 раз в две недели, против блох – 1 раз в месяц. Подстилку для животных обрабатывают из расчета 4 нажатия на клапан спрея – на 1 м² поверхности. В течение 3 дней не допускают контакта животного с обработанными предметами, а перед использованием их стирают с моющим средством.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

При применении препарата согласно инструкции побочных явлений и осложнений не наблюдается. При попадании на слизистые оболочки вызывает раздражение.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказан больным и выздоравливающим животным, кормящим самкам, а также щенкам и котятам до 10-недельного возраста.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Обработку проводят на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях. При попадании спрея на кожу или слизистые оболочки человека, препарат необходимо смыть обильным количеством воды.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат следует хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, при температуре от 0°C до 30°C. Срок годности при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 24 месяца со дня производства. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.